

## SOBRE UMA COLEÇÃO DE AVES DO SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ

FERNANDO C. NOVAES

A coleção de aves estudada no presente trabalho foi feita por José Hidasí e Manuel Amaral sob a direção de Cory T. Carvalho, sob os auspícios do Museu Paraense Emílio Goeldi — Pará. A área percorrida pelos expedicionários, da última semana de julho a outubro de 1957, compreendeu a região entre os rios Araguaia e Xingu, aproximadamente a 8°S e 52°W no Estado da Pará, região até então jamais investigada com intuítos ornitológicos.

Nosso conhecimento da avifauna da parte sul do Pará, repousa principalmente no recente artigo de Pinto & Camargo (14) sobre uma coleção de aves da serra de Cachimbo, situada entre os rios Tapajos e Xingu. No presente artigo, muitas espécies são pela primeira vez assinaladas dentro dos limites políticos do Estado do Pará; além disso o estudo desta coleção possibilitou termos uma ideia mais precisa dos limites naturais entre a avifauna hileana e a do Brasil central.

Foram as seguintes as estações de coleta:

**Conceição do Araguaia:** é uma pequena cidade localizada na margem esquerda do rio Araguaia. A coleta de aves foi realizada principalmente na parte sul da cidade em região de campos-cerrados. Largos trechos de matas são encontrados a uns poucos quilômetros ao norte.

**Gorotire, Posto Indígena de Atração ou Gradaús:** vilarejo localizado no rio Fresco, um dos maiores tributários da margem direita do rio Xingu. Todas as aves colecionadas neste local foram rotuladas sob o nome Gorotire, ainda que nos mapas se ache indicado o

nome Gradaús. No local os moradores também o conhecem com o nome de Gorotire e o Serviço de Proteção aos Índios denominam de "Posto Gorotire", desconhecendo a denominação Gradaús. O mesmo acontecendo com o pessoal da Força Aérea.

O rio Fresco possui inúmeras corredeiras e rápidos, os quais são sérios obstáculos para a navegação. Florestas são encontradas ao longo das margens do rio formando matas ciliares, inundadas durante a estação chuvosa. Além das matas ciliares há campos-cerrados e florestas secundárias, desde que tempos atrás a região foi densamente povoada, tendo sido derrubados largos trechos da mata primitiva para fins agrícolas, hoje abandonados.

**Riosinho, Posto Indígena de Atração Nilo Peçanha ou Kuben-kra-kégn:** Riosinho é um tributário da margem esquerda do rio Fresco. Como este último as corredeiras e cachoeiras são numerosas sendo a maior a cachoeira da Fumaça com cerca de 40 metros de altura. A floresta ciliar acha-se menos alterada pelas atividades humanas e liga-se com a floresta pluvial do rio Xingu. Os cerrados se estendem em grandes extensões, localizados em geral nas áreas elevadas, nos topos das chapadas com a direção principal para o sudeste.

Para maiores detalhes do aspecto fisiográfico e mapa da região consultar Carvalho (2).

O início do presente trabalho foi elaborado no Museu Goeldi; posteriormente, com o nosso ingresso no Departamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura de São Paulo, reestudamos parte da coleção.

Agradecemos ao colega Cory T. Carvalho pelos informes quanto ao aspecto paisagístico da região e à Associação de Defesa da Flora e da Fauna, São Paulo, pela bolsa a nós concedida, permitindo-nos pesquisar em regime de tempo integral.

Os nomes vulgares das Aves são usados segundo Pinto (10).

## LISTA SISTEMÁTICA

### FAMILIA TINAMIDAE

- Crypturellus undulatus adpersus* (Temminck)  
Macucaua  
Gorotire, rio Fresco: 1 ♂ — 28 de agosto, 1 ♀ — 2 de setembro

Ambos os exemplares foram abatidos na floresta secundária das margens do rio. A raça *adpersus* distribuiu-se ao sul do baixo Amazonas, alcançando a oeste a margem direita do rio Madeira. Ao sul atinge os limites naturais da hileia, serra do Cachimbo e rio Fresco. No Brasil central é substituída pela forma *vermiculatus*.

- Crypturellus parvirostris* (Wagler)  
Inambú-choró  
Gorotire, rio Fresco: 1 ♂ — 30 de julho

Coletado no cerrado. Esta espécie é característica do Brasil central, alcançando todavia, a margem meridional do Rio Amazonas (Santarem).

### FAMILIA PHALACROCORACIDAE

- Phalacrocorax brasilianus brasilianus* (Gmelin)  
Biguá  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ — 21, 22 de setembro

### FAMILIA ANHINGIDAE

- Anhinga anhinga anhinga* (Linnaeus)  
Carará  
Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 25 de setembro

### FAMILIA ARDEIDAE

- Ardea cocoi* Linnaeus  
Maguari  
Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♂ — 24 de setembro  
*Butorides striatus striatus* (Linnaeus)  
Socó  
Gorotire, rio Fresco: 1 ♀ — 16 de agosto  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 17 de setembro

- Tigrisoma lineatum lineatum* (Boddaert)

Socó-boi

- Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♂ — 22 de setembro

O exemplar não é adulto. O referimos à forma típica em virtude de suas exiguas dimensões, tendo o comprimento da asa 320 mm.

### FAMILIA THRESKIORNITHIDAE

- Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin)  
Tapicuru  
Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♀ — 23 de setembro  
Gorotire, rio Fresco: 1 ♀ — 29 de julho

### FAMILIA ACCIPITRIDAE

- Ictinia plumbea* (Gmelin)  
Gavião-pombo  
Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♂ — 15 de setembro  
Gorotire, rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 3, 8 de setembro

Os exemplares foram colecionados no cerrado.

- Buteo magnirostris magnirostris* (Gmelin)  
Gavião-pega-pinto  
Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♀ — 22 de setembro, 1 ♂ — 1.º de outubro  
Gorotire, rio Fresco: 2 ♂ — 5, 9 de setembro

Os exemplares apresentam caracteres intermediários entre a raça típica e a forma nordestina. Os machos medem de asa 207 e 210 mm e a fêmea 222 mm. Sobre as diversas raças de *Buteo magnirostris* no Brasil consultar Pinto (11) e Hellmayr & Conover (8).

- Urubitinga urubitinga urubitinga* (Gmelin)  
Gavião-caipira  
Gorotire, rio Fresco: 1 im. (sexo ?) — 17 de agosto

A asa mede 401 mm e a cauda 263 mm.

### FAMILIA FALCONIDAE

- Milvago chimachima chimachima* (Vieillot)  
Caracará-branco  
Gorotire, rio Fresco: 1 ♂ — 22 de agosto  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 15 de setembro

### FAMILIA CRACIDAE

- Crax fasciolata fasciolata* Spix  
Mutum-pinima  
Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♀ — 25 de setembro

O exemplar possui a crista branca com o apice preto. As faixas transversais do dorso, coberteiras das asas, remiges e uropígio branco-amareladas, com 1 mm de largura. Retrizes com faixas estreitas conspicuas.

*Penelope pileata* Wagler

Jacú-vermelho

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 29 de julho

Segundo Hellmayr & Conover (7) esta espécie tinha sua distribuição geografia limitada entre os rios Tapajós e Madeira. O presente exemplar permite estendê-la mais para leste, na bacia do rio Xingu.

*Penelope superciliaris superciliaris* Temminck

Jacúpeba

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 27 de agosto, 6 de setembro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 16 de setembro.

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 (sexo?) — 19 de outubro

*Ortalis motmot ruficeps* (Wagler)

Aracua-de-cabeça-vermelha

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 27 de agosto

O exemplar mede 193 mm de asas.

*Pipile cumanensis nattereri* Reichenbach

Jacutinga

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 27 de agosto

#### FAMILIA OPISTHOCOMIDAE

*Opisthocomus hoazin* (Müller)

Cigana

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 23 de setembro

#### FAMILIA RALLIDAE

*Aramides cajanea cajanea* (Müller)

Saracura-tres-potes

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 25 de setembro

#### FAMILIA EURYPYGIDAE

*Eurypyga helias helias* (Pallas)

Pavãozinho-do-Pará

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 30 de julho

#### FAMILIA CHARADRIIDAE

*Hoploxypterus cayanus* (Latham)

Maçarico-de-esporão

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 31 de julho

Nilo Peçanha, Riosinho: 2 ♀, 1 ♂ — 18 de setembro

*Pluvialis dominica dominica* (Müller)

Maçarico-do-campo

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 28 de agosto e 29 de setembro

Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♂ — 25 de setembro

*Charadrius collaris* Vieillot

Maçarico-de-coleira

Nilo Peçanha, Riosinho, 1 ♂ — 19 de setembro

#### FAMILIA SCOLAPACIDAE

*Bartramia longicauda* (Bechstein)

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 15 de setembro

*Tringa melanoleuca* (Gmelin)

Maçarico-grande-da-praia

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 18 de setembro

*Tringa solitaria solitaria* Wilson

Maçarico-pequeno

Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♀ — 19 de setembro

A asa mede 127 mm, concordando com as medidas da forma típica indicada pelos autores.

*Capella paraguayae paraguayae* (Vieillot)

Narceja

Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 3 ♂ — 19, 24 de setembro, 10 de outubro

*Erolia melanotos* (Vieillot)

Maçariquinho

Conceição do Araguaia, rio Araguaia: 1 ♀ — 7 de outubro

#### FAMILIA LARIDAE

*Phaetusa simplex simplex* (Gmelin)

Gaivota

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 19 de setembro, 1 ♂ — 15 de outubro

*Sterna superciliaris* Vieillot

Trinta-reis-pequeno

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 30 de julho

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 19 de setembro

#### FAMILIA RYNCHOPIDAE

*Rynchops nigra intercedens* Saunders

Talha-mar

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀, 1 ♂ — 27 de julho, 19 de setembro

#### FAMILIA COLUMBIDAE

*Columba speciosa* Gmelin

Pomba-trocal

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 10 de outubro

- Columba cayennensis sylvestris* Vieillot  
Pomba-legítima  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 2 ♀ — 30 de julho e 2, 15 de setembro  
*Scardafella squammata squammata* (Lesson)  
Fogo-apagou  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♀, 1 ♂ — 19 de setembro

Esta é a primeira notificação da espécie para o Estado do Pará.

- Columbigallina minuta minuta* (Linnaeus)  
Rolinha  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 7 de setembro  
*Columbigallina talpacoti talpacoti* (Temminck)  
Rola-roxa  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 15 de outubro  
*Uropelia campestris* Spix  
Rola-vaqueira  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 23 de setembro  
*Claravis pretiosa* (Ferrari-Perez)  
Rola-azul  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 28 de julho e 25 de setembro  
*Leptotila rufaxilla rufaxilla* (Richard & Bernard)  
Juriti-verdadeira  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♀ — 29, 30 de agosto, 24 de setembro

#### FAMILIA CUCULIDAE

- Piaya cayana cayana* (Linnaeus)  
Chicoã  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 29 de agosto  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀, 2 ♂ — 20 de setembro e 2, 4 de outubro  
A serie acima se aproxima bastante das populações do baixo Amazonas. Seguimos Griscom & Greenway (4) referindo-a à forma típica.  
*Coccyua minuta minuta* (Vieillot)  
Chicoã-pequeno  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 7 de outubro  
*Taepora naevia naevia* (Linnaeus)  
Matinta-pereira  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 9 de setembro  
*Dromococcyx phasianellus* (Spix)  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 28 de setembro  
*Crotophaga ani* Linnaeus  
Anum  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 30 de agosto  
*Crotophaga major* Gmelin  
Anum-coroça

- Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 1.º e 26 de setembro  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♀, 1 ♂ — 25, 28 e 30 de setembro  
*Guira guira* (Gmelin)  
Anum-branco  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ — 3 e 21 de setembro

#### FAMILIA PSITTACIDAE

- Ara macao* (Linnaeus)  
Arara-vermelha  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 1.º de agosto  
*Ara severa severa* Linnaeus  
Maracanã-guassú  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 25 de agosto

O exemplar mede de asa 222 mm. Gyldenstolpe (5) ao estudar exemplares desta Maracanã, provenientes do Rio Juruá, comenta sobre as diferenças de medidas que apresentam as diversas populações de *Ara severa*, reconhecendo para as aves do Juruá uma raça a parte, *A. s. castaneifrons* Lafresnaye, a mesma da Bolívia, cujo caráter principal é o maior tamanho de asa.

- Diopsittaca nobilis cumanensis* (Lichtenstein)  
Maracanã  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 1.º de setembro

A asa mede 179 mm. Ovarios com ovulos ainda pequenos.

- Aratinga leucophthalma leucophthalma* (P. L. S. Muller)  
Maracanã-i  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 13 de setembro  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 (sexo?) — 29 de setembro  
*Aratinga aurea aurea* (Gmelin)  
Periquito-rei  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 3 ♀ — 4 de agosto, 1, 9, 13, 25 de setembro  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ — 7 de julho e 11 de outubro  
*Pyrrhura picta microtera* Todd  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 2 ♀ — 3 de agosto e 2, 5 de setembro

O macho mede 113 mm de asa e as fêmeas 109.1 e 109.6 mm. Usamos o nome proposto por Todd (16) para as aves que habitam a região média do Xingu e Rio Fresco.

- Pyrrhura perlata anerythra* Neumann  
Nilo Peçanha, Riosinho: 2 ♂ — 14, 16 de setembro

As peles acima concordam com cinco outras do Rio Pracupi, Portel, Pará e baixo Amazonas referidas à *anerythro* segundo Pinto (12). Os dois exemplares acima estendem mais para o sul a area geografica desta raça.

*Brotogeris chiriri* (Vieillot)

Periquito

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 2 ♀ — 27 de julho, 1.º, 15 de outubro

*Brotogeris crysopterus tuipara* (Gmelin)

Tuípara

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♀ — 30 de julho, 1, 9 de setembro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 14 de setembro

Os exemplares acima estendem para o sul a area geografica desta raça.

*Amazona amazonica amazonica* (Linnaeus)

Curica

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 11, 14 de outubro

*Pionites leucogaster leucogaster* (Kuhl)

Marianinha

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 23 de agosto

#### FAMILIA STRIGIDAE

*Otus choliba* subsp.

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 21 de setembro

O exemplar é jovem, ainda com restos da plumagem natal, o que torna impraticavel a determinação subespecifica.

*Glaucidium brasilianum brasilianum* (Gmelin)

Caburé

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 9 de setembro, 1 ♀ — 30 de setembro

O exemplar macho é da fase parda enquanto que a femea é ruiva.

#### FAMILIA NYCTIBIIDAE

*Nyctibius griseus griseus* (Gmelin)

Urutáu

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 28 de setembro

O exemplar mede de asa 264 mm. Outro do Rio Jaumachim, Pará, mede 250 mm, sendo mais arruivado em sua plumagem. Uma femea do Rio Iriri é ainda maior medindo a asa 270 mm.

#### FAMILIA CAPRIMULGIDAE

*Chordeiles acutipennis acutipennis* (Boddaert)

Bacurau

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ —

18 de outubro. Ovarios com pequenos ovulos

*Nyctiprogne leucopyga leucopyga* (Spix)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♀, 2 ♂ — 20 e 26 de julho e 4, 7 de outubro

O macho mede 138 mm de asa e as femeas 129-131 mm. Um dos machos é imaturo possuindo as pontas das secundarias ruivas. Esta serie não pertence positivamente à raça descrita recentemente por Pinto e Camargo (13) de Dumbá, margem esquerda do Rio Araguaia, Mato Grosso, cuja asa mede 147 mm.

*Podager nacunda nacunda* (Vieillot)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 31 de agosto

*Hydropsalis climacocerca canescens* Griscom & Greenway

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 31 de agosto

A determinação subespecifica do exemplar acima é provisoria. Autores como Todd (15) e Griscom & Greenway (3) que possuiam series maiores e estudando o mesmo material, não defendem o mesmo ponto de vista quanto ao numero de formas validas na presente especie. No momento não estamos habilitados a emitir opinião sobre o assunto por falta de material abundante para comparação.

*Nyctidromus albicollis albicollis* (Gmelin)

João-corta-pau

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 3 de outubro. A asa mede 144 mm.

#### FAMILIA TROCHILIDAE

*Calliphlox amethystina* (Boddaert)

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 1.º de agosto e 6 de setembro

*Amazilia fimbriata nigricauda* (Elliot)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 1 ♀ — 27 de setembro e 11, 18 de outubro

*Thalurania furcata baeri* (Hellmayr)

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 14 de setembro

*Anthracothorax nigricollis* (Vieillot)

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 3 de agosto e 2 de setembro

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 24 de julho

Sobre as possiveis raças nesta especie consultar Zimmer (18).

*Heliothryx aurita phainolaema* Gould

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 12 de setembro

*Lophornis chalybea verreauxii* J. & E. Verreaux

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 19 de setembro

Glydenstolpe (5) foi o primeiro autor a registrar *Lophornis verreauxii* no Brasil com base numa fêmea proveniente do Rio Eiru, Santo Antonio, Estado do Amazonas e tres machos de Codajá, Amazonas, Rio Solimões margem norte.

O exemplar de Conceição do Araguaia, difere de uma pele de preparação típica de "Bogotá", Colombia, em ter a cauda mais escura, quase sem reflexos cupreos, verde do dorso mais escuro, penas alongadas mistacais tambem de um verde mais carregado e a crista com a cor bronze mais escura.

Em 1902, Berlepsch e Hartert (1), descreveram uma raça — *Lophornis verreauxii klagesi* (= *Lophornis chalybea klagesi*) de Suapure, Rio Orinoco, Venezuela, cujas diferenças entre ela e a forma típica são: "The colour of the whole body is of a darker green; the rectrices and upper tail — converts differs strikingly in their darker bronzy olive instead of darker coppery bronze-colour. The long ornamental feathers on the sides of the throat are of a darker green, and have smaller and less conspicuous white tips". Por conseguinte observa-se que tanto a raça *klagesi* como o exemplar de Conceição do Araguaia tendem a ser mais escuros que os da Colombia. Acreditamos que somente comparando material de Conceição do Araguaia com material do Rio Orinoco se poderá elucidar tratar-se de duas formas ou não, o que no momento não estamos habilitados a fazer. É possível que em virtude do afastamento geografico, as duas populações sejam formas diferentes. Sobre a nomenclatura desta especie consultar Zimmer (18).

#### FAMILIA TROGONIDAE

*Trogon strigilatus strigilatus* Linnaeus

Surucuá-de-barriga-amarela

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 28 de setembro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 2 de agosto, 2 ♀ — 12 de setembro

*Trogon curucui curucui* Linnaeus

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 9, 12 de setembro

*Trogon violaceus crissalis* (Cabanis & Heine)

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 28 de agosto, 3 de setembro.

Sobre as diversas raças geograficas e nomenclatura da especie consulta Zimmer (17).

#### FAMILIA ALCEDINIDAE

*Chloroceryle amazona* (Latham)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀

*Chloroceryle americana americana* (Gmelin)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 31 de agosto

#### FAMILIA MOMOTIDAE

*Momotus momota simplex* Chapman

Hudú

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 25 de agosto e 12 de setembro

Não deve passar sem reparo a notificação desta raça a leste do rio Xingu. Do ponto de vista geografico deveriam pertencer os exemplares à raça *cametensis* pois em trabalho anterior (9) notificamos sua presença na bacia do rio Araguaia em Santa Isabel. Porém os exemplares aqui estudados não exibem o caráter atribuído à forma do rio Tocantins.

#### FAMILIA GALBULIDAE

*Galbula dea amazonum* Sclater

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 5 de setembro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 14 de setembro

Medidas: asa 90.4-93.2 mm, cauda: 149.4-159.9 mm, culmen 55.5-51.3 mm.

*Galbula ruficauda rufoviridis* Cabanis

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 7 ♀, 3 ♂ — 25, 27 de setembro, 4, 9, 11, 19 de outubro

*Brachygalba lugubris melanosterna* Sclater

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 3 de setembro

Conceição de Araguaia, Rio Araguaia: 1 (sexo?) — 26 de julho

Concordam com duas peles de Chavantina, Rio das Mortes, Mato Grosso. Bico amarelo-pálido.

#### FAMILIA BUCCONIDAE

*Notharchus tectus tectus* (Boddaert)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 8, 11 de outubro

*Nystalus maculatus parvirostris* (Hellmayr)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 2 ♀ — 3, 5, 6, 15 de outubro

Medidas dos machos: asa 74.6-72.7 mm, cauda 63.3-64.5 mm, culmen 31.4-32.1 mm. Fêmeas: asa 71-74.5 mm,

cauda 67.2-65.1 mm, culmen 34.2-35.5 mm.

*Nystalus chacuru chacuru* (Vieillot)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 5 de setembro, 1 ♀ — 26 de agosto

*Monasa morphaeus morphaeus* (Hahn & Kuster)

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀, 1 ♂ — 21 de agosto, 3, 9 de setembro

*Monasa nigrifrons nigrifrons* (Spix)  
Bico-de-braza

Gorotire, Rio Fresco: 4 ♂, 1 ♀ — 4, 8 de agosto, 7, 8, 28 de setembro

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 2, 3 de outubro

*Chelidoptera tenebrosa tenebrosa* (Pallas)  
Urubuzinho

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂, 1 ♀, 2 (sexo?) — 24, 25 de julho, 7 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 4 ♂, 2 ♀ — 6, 9, 11 de setembro

#### FAMILIA RAMPHASTIDAE

*Ramphastos tucanus* Linnaeus  
Tucano-de-peito-branco

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 18 de setembro

O bico é preto com a parte da mandíbula superior avermelhada, coberteiras superiores da cauda amarelo citrino. O exemplar é adulto e possui as seguintes medidas: asa 239 mm, culmen 141.3 mm.

*Ramphastos vitellinus theresae* Reiser  
Tucano

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 5, 25 de setembro

Esta raça de *Ramphastos vitellinus* tinha sua área geográfica restrita à região superior do vale do Rio Parnaíba entre os Estados do Maranhão e Piauí. Os exemplares do rio Fresco estendem muito mais para o oeste sua área geográfica. Nesses exemplares as coberteiras supracaudais são amarelo com algumas penas alaranjadas, a garganta e mento de cor cadmíio claro em vez de alaranjado profundo como em *ariel* e a região ocular nua, verde.

*Pteroglossus aracari aracari* (Linnaeus)  
Arassari

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 24 de agosto

#### FAMILIA PICIDAE

*Colaptes campestris campestris* (Vieillot)  
Chã-chã

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 3 ♀ — 10, 12 de outubro, 24 de setembro

Os exemplares concordam perfeitamente com espécimens de Aragarças, sul de Goiás.

*Celeus flavescens intercedens* Hellmayr  
Pica-pau-de-cabeça-amarela

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 21 de setembro

*Dryocopus lineatus lineatus* (Linnaeus)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 1.º, 11 de outubro

*Phleocoastes rubricollis olallae* (Gyldenstolpe)  
Pica-pau-de-penacho

Gorotire, Rio Fresco, 1 ♀ — 9 de setembro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 15 de setembro

Medidas da asa: 179 e 184 mm.

*Unilornis affinis ruficeps* (Spix)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 30 de setembro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 27 de agosto

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 14 de setembro

*Picumnus guttifer* Sundevall

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 3 ♀ — 22, 19, 27 de setembro, 4 de outubro

Esta é a primeira notificação da espécie para o Estado do Pará e a mais setentrional da espécie.

#### FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE

*Xiphorhynchus picus picus* (Gmelin)  
Arapaçu

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ — 4, 8 de outubro

As raças de *Xiphorhynchus picus* no Brasil não foram devidamente postas em base convincente. Os diversos autores que as tem estudado, não são acordes quanto ao número de formas validadas, nem quanto a área geográfica de cada forma.

*Lepidocolaptes angustirostris coronatus* (Lesson)

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 15 de setembro

*Glyphorhynchus spirurus cuneatus* (Lichtenstein)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 28 de agosto

*Sittasomus griseicapillus amazonum* Lafresnaye

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 7 de julho, 4 de setembro

*Dendrocincla fuliginosa rufo-olivacea* Ridgway

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 26 de julho

**FAMILIA FURNARIIDAE**

*Furnarius figulus pileatus* Sclater & Salvin  
Amassa-barro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 31 de agosto

*Synallaxis gujanensis gujanensis* (Gmelin)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ —  
7 de outubro

*Poecilurus scutatus scutatus* (Sclater)

5 de outubro

*Certhiaxis cinnamomea cinnamomea* (Gmelin)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1  
♀ — 19 de setembro

*Cranioleuca vulpina vulpina* (Pelzeln)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ —  
24 de setembro e 4 de outubro

*Xenops minutus genibarbis* Illiger

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 8 de setembro

*Xenops rutilans chapadensis* Zimmer

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 26 de agosto e  
7 de setembro

*Xenops tenuirostris tenuirostris* Pelzeln

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 29 de agosto

O presente exemplar amplia mais para leste a área geográfica da espécie até então conhecida somente até a bacia do Tapajós, em ambas as margens.

**FAMILIA FORMICARIIDAE**

*Sakesphorus luctuosus araguayae* (Hellmayr)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 6 ♂,  
4 ♀ — 26 de julho, 21, 22, 30 de setembro,  
4, 7, 13 de outubro

Novo para o Estado do Pará. Ficando a área geográfica da subespécie mais ampliada para o norte.

*Thamnophilus doliatus difficilis* Hellmayr

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ —  
30 de setembro e 13 de outubro

*Thamnophilus amazonicus obscurus* Zimmer

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 3 ♀ — 25 de  
agosto e 8, 13 de setembro

Estas peles diferem em alguns pontos de exemplares de *obscurus* à nossa disposição provenientes do rio Iriri e Igarapé Fortaleza (margem esquerda do médio Xingú). As fêmeas possuem o dorso cinza oliváceo com algumas penas pretas. As retrizes medianas são pretas nos exemplares do rio Fresco, somente a fêmea de 25 de agosto exibe um ligeiro banho pardo-ferrugineo porém não na mesma intensidade de *paraensis* da qual possuímos uma série numerosa. O pileo é mais pálido, menos ferrugineo próximo a amarelo-ocre, as

partes inferiores amarelo-ocre claro, enquanto que nas peles da região Xingú-Iriri são mais escuras.

*Thamnophilus torquatus* Swainson

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 8 de agosto

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ —  
28 de setembro

Esta é uma espécie de larga distribuição no Brasil central. A primeira notificação para o Estado do Pará deve-se a Pinto e Camargo (14) com base em exemplares da serra de Cachimbo, entre o Tapajós e Xingú.

*Myrmotherula axillaris axillaris* (Vieillot)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 8 de setembro

*Myrmotherula menetriesi omissa* Todd

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♀ (= ♂) —  
30 de julho e 7 de setembro

*Formicivora grisea grisea* (Boddaert)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 7 ♂, 3  
♀ — 21, 24, 28 de setembro, 1, 2, 3, 10 de  
outubro

*Hypocnemoides maculicauda orientalis* Gylden-  
tolpe

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 28 de julho, 1  
♀ — 4 de agosto

*Hylophylax naevia ochracea* Berlepsch

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 30 de agosto

*Hylophylax poecilonota vidua* (Hellmayr)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 28 de agosto

O exemplar difere da raça *nigrigula* pela redução considerável da mancha branca interescapular.

*Cercomacra cinerascens iterata* Zimmer

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 31 de julho

*Cercomacra nigrescens ochrogyna* Sneath

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ —  
5 de outubro

Por se tratar de um macho torna-se difícil observar os caracteres subespecíficos, melhor representados nas fêmeas, no entanto, pode o exemplar pertencer à raça descrita por Sneath, cuja localidade típica é Furo-da-Pedra, Ilha do Bananal, Rio Araguaia.

*Myrmophylax atrothorax melanura* (Menetries)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ —  
2 de outubro

**FAMILIA CONOPHAGIDAE**

*Corythoipsis torquata anthoides* (Pucheran)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 3 de setembro

**FAMILIA RHINOCRYPTIDAE**

*Melanopareia torquata torquata* (Wied)  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 7 de setembro

**FAMILIA COTINGIDAE**

*Cotinga cayana* (Linnaeus)  
Anambé-roxo  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 26 de agosto e 5 de setembro  
*Iodopleura isabellae* Parzudaki  
Gorotire, Rio Fresco: 3 ♂, 1 ♀ — 3, 11, 13 de setembro  
*Rhytipterna simplex frederici* (Bangs & Penard)  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 11 de setembro  
*Lipaugus vociferans* (Wied)  
Cricrió  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♀ — 2, 13 de outubro  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 3 ♀ — 31 de julho, 8 de setembro, 28 de agosto  
*Pachyramphus polychopterus tristis* (Kaup)  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 30 de setembro  
*Tityra semifasciata semifasciata* (Spix)  
Anambé-branco  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 26 de julho  
*Querula purpurata* (Müller)  
Anambé-una  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 11 de setembro  
*Cephalopterus ornatus ornatus* Geoffroy Saint-Hilaire  
Uiramembí  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 17 de agosto

**FAMILIA PIPRIDAE**

*Xenopipo atronitens* Cabanis  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 2 ♀ — 24 de julho, 4, 19 de outubro  
*Tyrannetes stolzmanni* (Hellmayr)  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 4, 8 de setembro  
*Chiroxiphia pareola pareola* (Linnaeus)  
Uirapurú-de-cabeça-encarnada  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♂ imm., 1 ♀ — 25, 28 de agosto, 9, 12 de setembro  
*Manacus manacus purissimus* Todd  
Rendeira  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 19 de setembro, 1 ♀ — 19 de outubro  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 2 de setembro  
*Neopelma pallescens* (Lafresnaye)  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 4 ♂, 3 ♀ — 23, 27 de setembro, 3, 9, 14, 16, 21 de outubro  
*Heterocercus lineatus* (Strickland)  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 2 de setembro

**FAMILIA TYRANNIDAE**

*Knipolegus orenocensis xinguensis* Berlepsch  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 19 de outubro  
*Phaeotriccus poecilocercus* (Pelzeln)  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 4 de outubro  
*Fluvicola pica albiventer* (Spix)  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 1 ♀ — 19, 21 de setembro  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 4, 8 de outubro  
*Pirocephalus rubinus rubinus* (Boddaert)  
Príncipe  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 26 de julho  
*Muscivora tyrannus tyrannus* (Linnaeus)  
Tesoura  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 16 de setembro  
*Tyrannus melancholicus despotes* (Lichtenstein)  
Siriri  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 5 ♂, 4 ♀ — 24, 25 de julho, 20, 28 de setembro, 8, 9, 15, 19 de outubro  
Gorotire, Rio Fresco: 3 ♂, 1 ♀ — 6, 5, 10, 21 de setembro  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 14 de setembro  
*Empidonomus varius rufinus* (Spix)  
Riosinho, Nilo Peçanha: 2 ♂, 2 ♀ — 16 de setembro  
*Legatus leucophaius leucophaius* (Vieillot)  
Bentevi-pequeno  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 5 de setembro  
*Sirystes sibilater subcanescens* Todd  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 30 de julho  
*Myiodynastes solitarius* (Vieillot)  
Siriri-tinga  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 30 de setembro  
Gorotire, Rio Fresco: 5 ♀ — 28, 29 de agosto, 4 de setembro  
*Megarynchus pitangua pitangua* (Linnaeus)  
Bentevi-de-bico-chato  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 25 de julho  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 4 de setembro  
*Myiozetetes cayanensis cayanensis* (Linnaeus)  
Bentevizinho  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 26 de julho  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 12, 27 de agosto, 1 ♀ — 26 de agosto  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂, 1 ♀ — 15 de setembro  
*Pitangus sulphuratus maximiliani* (Cabanis & Heine)  
Bentevi

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 17 de setembro

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 16 de outubro

O exemplar de Conceição do Araguaia é imaturo, faltando as penas amarelas do pileo. Os exemplares acima concordam melhor com peles provenientes do Rio de Janeiro e de Goiás.

*Myiarchus tyrannulus bahiae* Berlepsch & Leverkühn

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 9 de setembro

*Myiarchus ferox ferox* (Gmelin)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂, 1 ♀ — 21 de setembro, 2, 14 de outubro

*Myiarchus tuberculifer tricolor* Pelzeln

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 2 de outubro

*Myiarchus swainsoni pelzelni* Berlepsch

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 24 de setembro

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 4, 6, de setembro

*Empidonax euleri euleri* (Cabanis)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 8 de setembro

Este exemplar foi determinado pelo Dr. A. Wetmore ao qual agradecemos.

*Cnemotriccus fuscatus bimaculatus* (Lafresnaye & Orbigny)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 3 ♀ — 1.º, 4, 8, 19 de outubro

*Terenotriccus erythrurus hellmayri* (Sneathlaga)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 16 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 28 de agosto

*Myiobius barbatus insignis* Zimmer

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 30 de julho e 28 de agosto

As medidas são as seguintes: macho asa 65.9 mm, cauda 55.1 mm; fêmea asa 61.5 mm, cauda 51.0 mm.

*Hirundinea bellicosa bellicosa* (Vieillot)

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 7 de setembro

*Tolmomyias poliocephalus sclateri* (Hellmayr)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 12 de setembro

*Tolmomyias flaviventris flaviventris* (Wied)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂ — 29 de setembro, 3, 5 de outubro

*Todirostrum cinereum cearae* Cory

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 5 ♂, 1 ♀ — 14, 23, 26, 27, 28 de setembro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 5 de setembro

*Todirostrum maculatum maculatum* (Desmarest)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 (sexo?) — 25 de setembro

*Idioptilon striaticollis griseiceps* (Todd)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 29 de setembro

O exemplar concorda bem com uma pele de Santarem e outra de Urucurituba, Rio Tapajós.

*Idioptilon zosterops griseipectus* (Sneathlaga)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 12 de setembro

*Idioptilon margaritaceiventer margaritaceiventer* (Lafresnaye & d'Orbigny)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 1 ♀ — 20 e 22 de setembro, 8 de agosto

*Sneathlaga minor* (Sneathlaga)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 31 de julho, 8 de setembro

*Serpophaga hypoleuca pallida* Sneathlaga

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 18 de outubro

O tipo de *Serpophaga pallida* Sneathlaga, não foi encontrado por nós nas coleções seriadas do Museu Goeldi-Pará.

*Inezia subflava subflava* (Sclater & Salvin)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 24 de setembro

*Elaenia chiriquensis albivertex* Pelzeln

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♀ — 4, 8 de outubro e 1 ♂, 1 ♀ — 24 de julho

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ 28 de julho

*Elaenia cristata* Pelzeln

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 2 ♀ — 22, 26 de setembro, 11 de outubro

*Myiopagis gainardii subcinereus* (Zimmer)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 5 de outubro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 14 de setembro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 3 de setembro

*Phaeomyias murina murina* (Spix)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 23 de setembro, 2 de outubro

*Camptostoma obsoletum napaem* (Rigday)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 24 de julho

*Pipromorpha oleaginea wallacei* Chubb

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 12 de setembro

#### FAMILIA HIRUNDINIDAE

*Progne chalybea chalybea* (Gmelin)

Andorinha grande

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 3 ♀ — 26 de agosto, 26 de setembro, 9 de outubro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 14 de setembro

Os machos medem de asa 131 e 134 mm e as fêmeas 128, 136 e 138 mm

*Stelgidopteryx ruficollis ruficollis* (Vieillot)  
Andorinha

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 28 de julho. 1 ♀ — 26 de agosto

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 21 de setembro

Ocorre aparentemente em todos os estados do Brasil. Sobre a possível ocorrência de outras raças no Brasil consultar Hellmayr (6) e Pinto (10).

*Iridoprocne albiventer* (Boddaert)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 28 de julho

*Atticora fasciata* (Gmelin)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 31 de agosto

*Atticora melanoleuca* (Wied)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂ — 24, 25 de setembro, 26 de julho

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 2 ♀ — 31 de agosto

#### FAMILIA CORVIDAE

*Cyanocorax cyanopogon* (Wied)

Cã-cã

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 2 ♀ — 26 de setembro, 3, 6, de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♀ — 3 de agosto, 5, 10 de setembro

Esta espécie não havia sido ainda assinalada para a avifauna do Pará.

#### FAMILIA TROGLODYTIDAE

*Thryothorus leucotis rufiventris* Sclater

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 1 ♀ — 28 de setembro, 3, 7 de outubro

A raça *rufiventris* tem sua área geográfica limitada ao Brasil central e centro-oriental. Pela primeira vez é inclusa esta forma na avifauna paraense.

#### FAMILIA MIMIDAE

*Minus saturninus frater* Hellmayr

Sabiá-do-campo

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 3 de outubro

#### FAMILIA TURDIDAE

*Turdus leucomelas albiventer* Spix

Carachué

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 24 de julho, 20 de setembro

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 4, 9 de setembro

*Turdus fumigatus fumigatus* Lichtenstein

Sabiá-da-mata

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 11 de setembro

#### FAMILIA SYLVIDAE

*Polioptila dumicola berlepschi* Hellmayr

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 3 de agosto

Esta é a primeira vez que *Polioptila dumicola* é registrada para o Estado do Pará.

#### FAMILIA CYCLARIDAE

*Cyclarhis gujanensis gujanensis* (Gmelin)

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 16 de setembro

*Cyclarhis gujanensis cearensis* Baird

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 5 de setembro e 5 de outubro

#### FAMILIA VIREONIDAE

*Vireo chivi chivi* (Vieillot)

Juruviara

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 1 ♀ — 26 de julho, 26 de setembro, 7 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 9 de setembro

*Hylophilus pectoralis* Sclater

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 12 de outubro

#### FAMILIA COEREBIDAE

*Chlorophanes spiza spiza* (Linnaeus)

Gorotire, Rio Fresco: 2 ♀ — 3, 29 de agosto

*Cyanerpes cyaneus cyaneus* (Linnaeus)

Gorotire, Rio Fresco: 3 ♂, 1 ♀ — 1.º, 3, 27 de agosto, 3 de setembro

*Cyanerpes caeruleus caeruleus* (Linnaeus)

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 30 de agosto

*Dacnis cayana cayana* (Linnaeus)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 6 ♂, 3 ♀ — 24 e 27 de julho, 23 e 27 de setembro, 1, 2, 3, 11 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 11 ♂, 3 ♀ — 3, 4, 6, 9, 12 de setembro e 3, 26, 27, 29 de agosto

*Coereba flaveola chloropyga* (Cabanis)

Tem-tem-coroado

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 8 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 2 ♀ — 3 de agosto e 2, 6 de setembro

Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂, 1 ♀ — 16 e 17 de setembro

#### FAMILIA PARULIDAE

*Basileuterus flaveolus* (Baird)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♀ — 28 de setembro e 13 de outubro

*Basileuterus auricapillus auricapillus* (Swainson)

Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀ — 28 de setembro  
*Basileuterus rivularis mesoleucus* Sclater  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 30 de agosto

#### FAMILIA TERSINIDAE

*Tersina viridis occidentalis* (Sclater)  
 Sai-andorinha  
 Gorotire, Rio Fresco: 4 ♂, 1 ♀, 1 (sexo?) — 28 de julho, 7, 27 de agosto, 8 de setembro

Estes exemplares estendem ainda mais para leste a distribuição desta forma, pois até agora era o rio Tapajós (Caxiricatuba) seu limite conhecido.

#### FAMILIA THRAUPIDAE

*Tanagra chlorotica chlorotica* Linnaeus  
 Gaturamo-miudinho  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 5 ♂, 1 ♀ — 27 de julho, 24, 26, 29 de setembro, 5, 7 de outubro

*Tanagra violacea violacea* (Linnaeus)  
 Tem-tem-verdadeiro  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂, 3 ♀ — 20 de setembro, 2, 4, 8 de outubro  
 Gorotire, Rio Fresco: 3 ♂, 1 ♀ — 4, 29 de agosto, 6, 12 de setembro

*Tangara cyanicollis melanogaster* Cherrie & Reinchenberger  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 2 ♀ — 25 de julho e 29 de setembro  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 7, 31 de agosto

*Tangara cayana sincipitalis* Berlepsch  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 2 ♀ — 20 de setembro, 7, 19 de outubro  
 Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♀ — 7 de agosto e 7 de setembro

*Thraupis sayaca sayaca* (Linnaeus)  
 Sanhaçu  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀, 1 ♂ — 24, 27 de setembro

*Thraupis virens virens* Linnaeus  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀, 2 ♂ — 5, 6, 9 de setembro

*Thraupis palmarum palmarum* (Wied)  
 Sanhaço-do-coqueiro  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂, 3 ♀ — 27, 28 de setembro e 5, 6, 7, 18 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 31 de julho  
*Ramphocelus carbo carbo* Pallas  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 6 ♂, 5 ♀ — 25 de julho, 21, 24, 26, 28 de setembro, 4, 7, 10, 17, 19 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 2, ♂ 2 ♀ — 4, 26 de julho, 11 de setembro  
 Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♀ — 14 de setembro

A série acima apresenta caracteres intermediários entre a forma típica e a raça *centralis* do Brasil central.

*Tachyphonus rufus* (Boddaert)  
 Pipira-preta  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 26 de julho e 25 de setembro  
 Gorotire, Rio Fresco: 4 ♂ — 1.º, 4 de agosto, 7, 8 de setembro  
*Tachyphonus phoeniceus* Swainson  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 4 ♂, 2 ♀ — 20, 26 de setembro, 8, 9, 11 de outubro

Este é o primeiro registro da espécie na bacia do Araguaia.

*Cypsnagra hirundinacea pallidigula* Hellmayr  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 9 de outubro

*Nemosia pileata pileata* (Boddaert)  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 24 de setembro  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 3 de agosto  
*Hemithraupis guira guira* (Linnaeus)  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ — 27 de setembro

*Thlypopsis sordida sordida* (Lafresnay & d'Orbigny)  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 27 de setembro e 7 de outubro

*Cissopis leveriana leveriana* (Gmelin)  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 4 de setembro  
*Schistochlamys melanopsis amazonica* Zimmer  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 5 ♂, 1 ♀ — 25 de julho, 21 de setembro, 9, 10, 15, 19 de outubro

Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 14 de agosto e 26 de setembro

#### FAMILIA ICTERIDAE

*Gymnostinops yuracares neivae* Sneathlage  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 23 de setembro  
*Cacicus cela cela* (Linnaeus)

Japim  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 2 ♀ — 26 de julho, 12 de outubro  
 Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 29 de agosto  
 Nilo Peçanha, Riosinho: 1 (sexo?) — 16 de setembro

*Archiplanus solitarius* (Vieillot)  
 Irá-una-de-bico-branco  
 Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂, 1 ♀ — 1.º, 5 de outubro

- Molothrus bonariensis bonariensis* (Gmelin)  
Chupim  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ —  
7 de outubro
- Icterus jamacaii croconotus* (Wagler)  
Corrupião  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♀, 1  
♂ — 7, 9 de outubro

#### FAMILIA FRINGILLIDAE

- Saltator maximus maximus* (P. S. Müller)  
Trinca-ferro  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 3 ♂, 2  
♀ — 25 de julho, 19, 21, 25, 29 de setembro  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂, 1 ♀ — 28 de ju-  
lho, 26 de agosto, 12 de setembro
- Saltator caerulescens mutus* Selater  
Sabiá-congá  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂, 1  
♀ — 19 de setembro e 10 de outubro  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 24 de setembro

Os exemplares concordam com peles provenientes da Ilha do Marajó, Amapá, Rio Tocantins. Nos espécimens de Conceição do Araguaia há tendência da cor branca da garganta possuir um leve banho ocráceo.

- Paroaria gularis gularis* (Linnaeus)  
Galo-de-campina  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ —  
1.º de outubro  
Gorotire, Rio Fresco, 1 ♂ — 31 de agosto
- Porphyrospiza caerulescens* (Wied)  
Gorotire, Rio Fresco: 2 ♂ — 27 de agosto e 5  
de setembro

O exemplar de 5 de setembro, apresenta a plumagem parda, característica de inverno. Este é o primeiro registro da espécie no Estado do Pará.

- Sporophila leucoptera cinereola* (Temminck)  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ —  
30 de setembro
- Sporophila caerulescens caerulescens* (Vieillot)  
Papa-capim  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂, 1 ♀ — 3, 6 de se-  
tembro
- Oryzoborus angolensis torridus* (Scopoli)  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 4 de setembro  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 16 de setem-  
bro
- Tolatinia jacarina splendens* (Vieillot)  
Tisiu  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 2 ♂ —  
8, 14 de outubro
- Spinus megalanicus alleni* Ridgway

- Nilo Peçanha, Riosinho: 2 ♂ — 15 de setem-  
bro
- Sicalis columbiana leopoldinae* Hellmayr  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 4 ♀, 9  
♂ — 21, 22, 23 de setembro, 3, 18 de outu-  
bro

Na serie acima observamos varios estadios de plumagem que exibem os machos. Num macho de 23 de setembro a plumagem é muito semelhante à da fema com somente indicios de amarelo na face, sendo presente o debrum amarelo-oliva das retrizes e remiges. Em um outro de 22 de setembro, o amarelo das bochechas e supercilios já está bastante nitido. Em tres outros de 18 de outubro e 22 de setembro, já aparecem no tope as primeiras penas de cor alaranjada.

- Charitospiza eucosma* Oberholser  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♂ — 6 de agosto

Colecionado no cerrado. Esta especie até então não era assinalada para o Estado do Pará.

- Coryphospiza pileatus pileatus* (Wied)  
Tico-tico-rei  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 5 ♂,  
1 ♀ — 19, 21, 26, 27, 28 de setembro, 5 de  
outubro
- Arremon taciturnus taciturnus* (Hermann)  
Coroado  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia: 1 ♂ —  
29 de setembro
- Myiospiza humeralis humeralis* (Bosc)  
Tico-tico-do-campo  
Gorotire: Rio Fresco: 1 ♂ — 5 de setembro  
Nilo Peçanha, Riosinho: 1 ♂ — 16 de setembro  
Conceição do Araguaia, Rio Araguaia — 1 ♀  
— 10 de outubro
- Zonotrichia capensis matutina* (Lichtenstein)  
Tico-tico  
Gorotire, Rio Fresco: 1 ♀ — 27 de agosto

#### ABSTRACT

An annotated list of Birds from southeastern State of Pará, Brazil between the Araguaia and Xingú rivers. The following species and subspecies are for the first time recorded to the State of Pará: *Scardafella squammata squammata*, *Lophornis chalybea verreauxii*, *Ramphastos vitellinus theresae*, *Picummnus guttifer*, *Sakesphorus luctuosus araguayae*, *Cercomacra nigrescens ochrogyna*, *Cyanocorax cyanopogon*, *Polioptila dumicola berlepschi*, *Porphyrospiza caerulescens*, *Charitospiza eucosma*.

## REFERENCIAS

- 1 — BERLEPSCH, H. & E. HARTERT: On the birds of the Orinoco region. *Novit. Zool. IX* (1): 1-134, 1902.
- 2 — CARVALHO, C. T. de: Sobre alguns mamíferos do sudeste do Pará. *Arq. Zool. Est. S. Paulo XI*: 121-132, 1960.
- 3 — GRISCOM, L. & J. C. GREENWAY JR.: Critical Notes on New Neotropical Birds. *Bull. Mus. Comp. Zool. XXV* (19): 243-55, 1937.
- 4 — IDEM: Birds of Lower Amazonia. *Bull. Mus. Comp. Zool. (LXXXVIII)* (3): 82-344, 1941.
- 5 — GYLDENSTOLPE, N.: The Bird Fauna of Rio Juruá in Western Brazil. *Kungl. Sv. Vet. Handlingar 22* (3): 1-338, 1945.
- 6 — HELLMAYR, C. E.: Catalogue of Birds of the Americas. *Zool. Ser. Field. Mus. Nat. Hist. XIII, part 8*: 1-541, 1935.
- 7 — HELLMAYR, C. E. & B. CONOVER: *Idem. Zool. Ser. Field. Mus. Nat. Hist. XIII, part 1, (1)*: vi+636, 1942.
- 8 — IDEM: *Idem. Ibidem. XIII, part 1, (4)*: vi+358, 1949.
- 9 — NOVAES, F. C.: Contribuição à ornitologia do Noroeste do Acre. *Bol. Mus. Par. Emilio Goeldi NS Zool. N.º 9*: 1-30, 1957.
- 10 — PINTO, O.: *Catalogo das Aves do Brasil. 2 partes.* Dept. Zool. Secr. Agric. S. Paulo: 1-700, 1944.
- 11 — IDEM: Contribuição ao estudo crítico das raças geográficas brasileiras de *Rupornis magnirostris* (Gmelin). *Rev. Arg. Zoogeog. IV* (3): 129-35, 1944.
- 12 — IDEM: Contribuição à ornitologia do baixo Amazonas. *Arq. Zool. Est. S. Paulo V* (6): 311-482, 1947.
- 13 — PINTO, O. & E. A. CAMARGO: Nova contribuição à ornitologia do Rio das Mortes, *Pap. Avulsos Dep. Zool. S. Paulo X* (11): 213-34, 1952.
- 14 — IDEM: Sobre uma coleção de Aves da Região de Cachimbo (sul do Estado do Pará). *Pap. Avulsos Dep. Zool. S. Paulo, X* (11): 213-34, 1952.
- 15 — TODD, W. E. C.: New South American Birds. *Ann. Carnegie Mus. XXV* (19): 243-55, 1937.
- 16 — IDEM: New South American Parrots. *Ann. Carnegie Mus. XXX* (19): 331-8, 1947.
- 17 — ZIMMER, J. T.: Studies of Peruvian Birds N.º 53 The family Trogonidae. *Am. Mus. Novit. n.º 1380*: 1-56, 1948.
- 18 — IDEM: Studies of Peruvian Birds n.º 57. The genera *Colibri*, *Anthracothorax*, *Klais*, *Lophornis* and *Chlorestes*. *Am. Mus. Novit. n.º 1463*, 1950.