

P A P É I S A V U L S O S

DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

SÔBRE UMA NOVA RAÇA AMAZÔNICA EM *TACHYPHONUS SURINAMUS* LINNÉ

por

OLIVERIO M. DE OLIVEIRA PINTO

Tachyphonus surinamus saturatus, nov. subsp.

DIAGNOSE. Semelhante à *Tachyphonus surinamus brevipes* Lafresnaye, mas diferente à primeira vista pela côr muito mais escura ou carregada da mancha coronal e especialmente do uropígio, antes ferrugíneo do que acanelado.

TIPO DE SANTA CRUZ, margem direita do Rio Eirú (afl. da margem direita do alto Juruá, logo acima de São Felipe, hoje João Pessoa): ♂ adulto, colecionado por A. M. OLALLA, Nov. 11 de 1936. N.º 19.185 da col. do "Museu Paulista", hoje Departamento de Zoologia.

Quatro ♂♂ adultos de *Tachyphonus surinamus*, dos quais um de João Pessoa (antiga São Felipe, alto Juruá) e três de Santa Cruz (Rio Eirú, afluente da margem direita do Juruá), não podem ser referidos a nenhuma das raças reconhecidas atualmente naquela espécie. Todos são entre si perfeitamente semelhantes, caracterizando-se principalmente pelo colorido da mancha coronal (topete) e do baixo dorso, que é antes ferrugíneo que acanelado e muito mais escuro do que em qualquer exemplar de *Tachyphonus surinamus brevipes* Lafresnaye, representado nas nossas coleções por um ♂ adulto da Colômbia e numerosos espécimes do alto Rio Negro (São Gabriel e Juaretê, col. CAMARGO) e da margem esquerda do Solimões (Coda-jaz, col. OLALLA).

A área da nova raça deve circunscrever-se à região mais ocidental do Brasil, ao sul do Rio Solimões, à cuja margem direita provavelmente se estende, como é lícito concluir-se de uma observação de HELLMAYR (Novitates Zoologicae, XIV, 1907, p. 45), que estudando um ♂ adulto de Tefé, colecionado por W. HOFFMANN, observou diferir êle dos espécimes da Colômbia ("Bogota collections") e do Rio Napo (leste do Equador), tipicamente pertencente à forma *brevipes* (de que *T. s. napensis* Law. é sinônimo) por "a decidedly darker rump and coronal patch which are deep tawny (Ridgw. V. fig. 1) instead of ochraceous (V. fig. 7)". No branco puro das manchas laterais do peito, aliás muito restritas, como em tudo mais, a raça juruana assemelha-se estreitamente a *T. s. brevipes* e muito especialmente aos exemplares da margem esquerda ou setentrional do Rio Solimões, como o provam três ♂♂ adultos de Codajaz. Não obstante, no que toca ao colorido da mancha coronal e do uropígio, as aves do Juruá divergem muito mais das de Codajaz do que entre si diferem as populações das margens setentrional e meridional do baixo Amazonas, adstritas respectivamente a *T. surinamus* e *T. s. insignis*. Isso prova, a meu vêr, a excelência da nova raça, cujas relações com *brevipes* não me é possível explanar de modo mais completo por me faltarem, do último, exemplares do leste do Perú. Entre as ♀♀ de *T. s. brevipes* e *T. s. saturatus*, representadas respectivamente por um exemplar de Codajaz e três do Juruá, não consigo todavia observar nenhuma diferença apreciável. Também, como se poderá verificar pelas medidas incluídas na tabela junta, não se observa qualquer diferença constante de tamanho entre as duas raças divididas pelo Rio Solimões.

MEDIDAS

Tachyphonus surinamus saturatus

			<i>asa</i>	<i>cauda</i>	<i>culmen</i>
N. 19.185,	♂ ad.,	S. Cruz (tipo).	78	mil. 70 mil.	13 1/2 mil.
N. 19.184,	♂ ad.,	" "	81	mil. 68 mil.	14 mil.
N. 19.547,	♂ ad.,	" "	80	mil. 69 mil.	13 mil.
N. 19.183,	♂ ad.,	João Pessoa ...	78	mil. 68 mil.	14 mil.
N. 19.656,	♀ ad.,	" "	76 1/2	mil. 68 mil.	12 1/2 mil.

Tachyphonus surinamus brevipes.

N. 16.394,	♂ ad.,	Codajaz	82	mil. 72 mil.	14 mil.
N. 16.395,	♂/ ad.,	" "	83	mil. 74 mil.	13 mil.
N. 17.001,	♂ ad.,	Jauaretê	81	mil. 70 mil.	15 mil.
N. 16.994,	♂ ad.,	São Gabriel ..	82	mil. 71 mil.	14 mil.
N. 15.940,	♀ ad.,	Codajaz	76	mil. 69 mil.	12 mil.

DESCRIÇÃO DO TIPO

Colorido geral preto, com brilho metálico azul-ferrete, particularmente acentuado na cabeça e no dorso; penas do vértice de colorido ruivo-alaranjado (Orange Rufous), formando mancha longitudinal ou topete; baixo dorso e uropígio de côr ferruginosa, mais carregada do que a do topete (“Sanford’s Brown”); humerais brancas, formando mancha bastante distinta na face antero-externa das asas; baixo abdômen manchado de cada lado de penas da côr das uropigiais; bico e pés pretos. Medidas: asa: 78 mils., cauda 70 mils., bico 13 $\frac{1}{2}$ mils.

