

# PAPÉIS AVULSOS

DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

---

## UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO "MONALONION" HERR.-SCHAEFFER

(HEMIPTERA - MIRIDAE)

P O R

OSCAR MONTE

Instituto Biológico, S. Paulo

### *Monalonion decoratus*, n. sp.

♂. CABEÇA amarelada, com tonalidade vermelha, junto aos olhos, escura (vertex, 0.68 mm.); tylus escuro; gula, genas e búcula, de um colorido ocráceo; sobre o vertex um pequeno e estreito sulco.

ANTENAS com o primeiro segmento (0.60 mm.) engrossado, piriforme, amarelado na base, escuro no centro e sanguíneo no ápice, dispersos pela sua superfície, notam-se algumas manchas sanguíneas; o segundo (3.69 mm.) muito longo, preto brilhante, levemente mais grosso no ápice, com pilosidade longa em toda a sua extensão, mas liso junto à base; o terceiro (3.39 mm.) piloso em toda a sua extensão, mas com menor densidade do que o segundo, e preto lúcido, sendo levemente afilado para o ápice; o quarto (1.08 mm.), preto fosco, menos piloso do que os dois anteriores.

OLHOS grandes, salientes, levemente arroxeados, tendo uma larga mancha escura na metade anterior.

ROSTRO (2.16 mm.) ocráceo, com o ápice escuro, não alcançando o segundo par de patas, e piloso especialmente no último segmento.

COLAR amarelado, com tonalidade sanguínea junto ao pronoto.

PRONOTO (compr. 1.18 mm; com o colar 1.48 mm.; largura na base: 2.04 mm.) amarelado, fortemente convexo, margem basal bisinuada, margens laterais retas.

ESCUTELO levemente convexo e amarelado.

HEMIÉLITROS de uma tonalidade amarelada e fosca, com manchas sanguíneas; o clavo amarelado, a base levemente ocrácea, tendo no centro uma faixa escura que se prolonga para o cório; o cório totalmente escuro-fosco, exceto a base que é ocrácea; cuneo sanguíneo, com a margem externa escura; embolium amarelado e estreito; membrana amarelo-pálida nos dois terços anteriores e o restante, fosco-fuliginosa; a base da aréola fortemente fosca, a nervura que limita com o cório, larga e sanguínea, os outros dois lados do triângulo areolar, de acordo com o colorido da membrana.

PATAS com os dois pares anteriores totalmente amarelados e tarsos escuros; o terceiro par com a coxa amarelada, tendo uma larga mancha escura, rodeada de tonalidade sanguínea; femur escuro com um anel amarelado no centro; tibias totalmente escuras e bastante pilosas em todos os três pares.

ABDOMEN amarelado, com manchas sanguíneas.

Comprimento até o ápice do abdomen: 5.87 mm. Comprimento total 9.13 mm.; largura, 2.00 mm.

HOLÓTIPO (fêmea), n. 105.118, na coleção do Departamento de Zoologia, de S. Paulo, colhido pelo dr. FREDERICO LANE, em Pirapitinga, Pirenópolis, Goiás, em 20-VI-1942.

A presente espécie pertence ao grupo que tem as tibias posteriores retas e a margem basal do pronoto bisinuada. Corre na chave apresentada pelo Prof. COSTA LIMA (Ch. e Qu., 57(3):520-521, 1938), junto à *Monalonion bondari* Costa Lima, mas tendo os fêmures enegrecidos na base e ápice.