

# PAPÉIS AVULSOS

DO

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA

SECRETARIA DA AGRICULTURA — S. PAULO - BRASIL

---

## OS GENÓTIPOS DA FAM. *FULCIDACIDAE* (*COL. CHRYSOMELOIDEA*)

POR

E. NAVAJAS

Esta lista, pretende fixar os genótipos dos *Fulcidacidae*. Os nomes invalidados, em virtude das “Regras Internacionais de Nomenclatura Zoológica”, apresentam-se entre colchetes. A cada nome de gênero, segue-se o do seu autor e, quando fôr o caso, o sinônimo que lhe corresponde. Na segunda linha, a data da publicação original do nome genérico, seguida da respectiva referência bibliográfica e do número de espécies originalmente incluídas, sempre que houver mais de uma. Depois do nome atual de cada genótipo, o nome primitivo, entre colchetes, com as indicações habituais; em seguida, a característica da designação, excluídos os casos de simples substituição de um nome genérico por outro. Sobre estas substituições, veja — NAVAJAS, 1944, Papéis Avulsos Dep. Zool. 4: 213-220.

Quaisquer observações críticas, sobre erros ou omissões, serão bem recebidas.

\* \* \*

**Arthrochlamys** Ihering & Ihering<sup>(1)</sup> [= *Chlamys* Knoch nec Bolten] 1904 [1905], Rev. Mus. Paul. VI: 642, nota.

Tipo — *Arthrochlamys foveolata* (Knoch). Veja *Chlamys*.

---

<sup>(1)</sup> Em recente trabalho — “Chinese Chrysomelid Beetles of the Subfamily Chlamisinae”, Ann. Ent. Soc. Amer. 39 (1), março de 1946, pp. 84-100 — consultado quando a presente lista de genótipos já estava em impressão, J. L. Gressitt adianta, sem maiores esclarecimentos, que, segundo comunicação de H. S. Barber, *Chlamisus* Rafinesque, 1815 deve ser usado em lugar de *Chlamys* Knoch, 1801 (nec Röding in Bolten, 1798).

[**Boloschesis** Jacobson =] *Arthrochlamys* Ih. & Ih.

1924, Rev. Russe Ent. 18: 239.

Tipo — *Arthrochlamys foveolata* (Knoch). Veja *Chlamys*.

**Carcinobaena** Lacordaire

1848, Monogr. Phyt. II: 647-8.

Tipo — *Carcinobaena pilula* (Klug) [= *Chlamys pilula* Klug, 1824, Entom. Mon.: 158-9, est. X, f. 12]. Monotipia.

[**Chlamys** Knoch nec Bolten, ou Röding =] *Arthrochlamys* Ih. & Ih.

1801, Neue Beytr. z. Insektenk. I: 122-128. 2 espécies.

Tipo — *Arthrochlamys foveolata* (Knoch) <sup>(2)</sup> [= *Chlamys foveolata* Knoch, 1801, Neue Beytr. z. Insektenk. I: 130, est. 4, f. 9]. Designação presente.

[**Diaspis** Lacordaire nec Costa, 1828 =] *Diplacaspis* Jacobson

1848, Monogr. Phyt. II: 645-6.

Tipo — *Diplacaspis paradoxa* (Lac.) = *Diaspis paradoxa* Lacordaire, 1848, Monogr. Phyt. II: 646-7]. Monotipia.

**Diplacaspis** Jacobson [= *Diaspis* Lac. nec Costa]

1924, Rev. Russe Ent. 18: 239.

Tipo — *Diplacaspis paradoxa* (Lac.). Veja *Diaspis*.

**Exema** Lacordaire

1848, Monogr. Phyt. II: 844. 16 espécies.

Tipo — *Exema punctatipes* Lacordaire, 1848, Monogr. Phyt. II: 853-4. Designação presente.

**Fulcidax** Voet [= *Poropleura* Lac.]

1806 ? <sup>(3)</sup>, Cat. Syst. Col. II: 33.

Tipo — *Fulcidax monstrosus* (F.) ? <sup>(4)</sup> [= *Fulcidax azureus* Voet ? 1806 ? Cat. Syst. Col. II: 33, est. 28, f. 1]. Monotipia. Veja *Poropleura*.

Lê-se em Neave (Nomenclator Zoologicus, 1939): "*Chlamisus* (emend. pro *mys* Berthold 1827) Rafinesque 1815, Analyse, 116." *Analyse*, isto é, *Analyse de la nature ou tableau de l'univers et des corps organisés*, Palermo, 1815, p. 116, obra que não pudemos consultar.

Gressitt adota, então, novo nome (*Chlamisinae*) para o grupo que, quer seja considerado como subfamília (*Fulcidacinae*) ou família (*Fulcidacidae*), já tem nome com prioridade assegurada.

<sup>(2)</sup> A primeira espécie, *tuberosa*, tem identificação muito discutida. O tipo designado, em 1810, por Latreille — "*Chlamide. Clythra monstrosa* Fab." — em "*Considérations Générales sur l'Ordre Naturel des Animaux...*", p. 432, é um *pseudótipo*, porque não faz parte das espécies originalmente incluídas em *Chlamys*.

<sup>(3)</sup> O Catálogo de Voet, parcialmente póstumo, foi provavelmente impresso de 1769 a 1804. Há exemplares com a data de 1806. A estampa 28, do vol. II, é posterior a 1778 (Cf. Horn und Schenkling, 1929, *Index Litteraturae Entomologicae* 4: 1266).

<sup>(4)</sup> A identidade, geralmente admitida pelos autores, entre a espécie de Voet e a de Fabricius não parece acertada, desde que se tenha por pertinente a

**Hymetes** Lacordaire

1848, Monogr. Phyt. II: 861.

Tipo — *Hymetes javana* Lacordaire, 1848, Monogr. Phyt. II: 862-3. Monotipia.**[Poropleura** Lacordaire =] *Fulcidax* Voet

1848, Monogr. Phyt. II: 863. 6 espécies.

Tipo — *Fulcidax monstrosus* (F.) [= *Poropleura monstrosa* (F.) = *Clythra monstrosa* Fabricius, 1798, Ent. Syst. Suppl.: 111]. Veja *Fulcidax*.**Pseudochlamys** Lacordaire

1848, Monogr. Phyt. II: 644.

Tipo — *Pseudochlamys megalostomoides* Lacordaire, 1848, Monogr. Phyt. II: 644-5. Monotipia.**[Skwarraia** van Emden =] *Diplacaspis* Jacobson

1932, Zool. Anz. 101: 9.

Tipo — *Diplacaspis paradoxa* (Lac.). Veja *Diaspis*.

## A B S T R A C T

A genotype list of the family *Fulcidacidae* (Col. Chrysomeloidea) is given; omissions and corrections will be gratefully received.

---

descrição, dada por Lacordaire (Monogr. Phyt. II: 863-5), de *F. monstrosus* (F.). O texto e a figura de Voet, sugerem a identificação de *F. azureus* Voet com alguma das espécies seguintes: a) *F. violaceus* (Klug, 1824); b) *F. bacca* (Kirby, 1818), espécie de colorido cúpreo que, no entanto, poderia apresentar exemplares de cor azul; c) outra espécie, ainda pouco conhecida e mui próxima das duas precedentes.

