

Papéis Avulsos de Zoologia

MUSEU DE ZOOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ISSN 0031-1049

PAPÉIS AVULSOS ZOOL., 37(1): 1-21

10.IX.1990

HABITATS, ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DAS ESPÉCIES DE AVES DO PANTANAL DE POCONÉ, MATO GROSSO, BRASIL

RENATO CINTRA*
CARLOS YAMASHITA**

ABSTRACT

A list of 317 bird species (from 61 families) with their habitats, relative abundance and seasonality is presented for the Pantanal of Poconé (16°S 56°W e 18°S 58°W), Mato Grosso, Brazil.

Observations were made between 1982 and 1986.

Of the total number of species 231 (72.9%) were resident and 86 (27.1%) were seasonal in occurrence.

There were 60 (18.9%) species of wading and "aquatic" birds. Of these 58.3% are migrant birds (i.e enter and leave the area annually).

The families Tyrannidae and Fringillidae had the largest number of species. In twenty-two families only one species occurred. Eighteen families (29.5%) and 143 species (45.9%) were Passeriformes, and 43 (70.5%) families and 174 species (54.1%) were from non-passerine orders.

INTRODUÇÃO

As informações básicas para melhorar o conhecimento sobre a distribuição geográfica das espécies de aves são obtidas inicialmente através de observações de campo e listagem local das espécies.

Alguns estudos já foram realizados nas áreas e regiões vizinhas ao Pantanal (para a Chapada dos Guimarães, Allen 1891, Naumburg 1930, para a Amazônia, Pinto 1932, Pinto e Camargo 1952, Novaes 1976, Willis 1977, para o Planalto Central, Negrett 1981, Negrett *et al.*, 1984; e para o Chaco, Short 1975).

Entretanto poucos levantamentos foram feitos dentro do Pantanal propriamente, exceto alguns de curto período de observação. Além disso estes estudos, na maioria listas, foram realizados em Municípios de Pantanaís do estado do Mato Grosso do Sul (na parte Central, Dubs 1983; em Corumbá e Nhecolândia, Weinberg 1984; em Nhecolândia, Cintra em elab.; em Miranda, Antas *et al.*, em elab.).

Apesar de existirem na literatura informações gerais para todo o continente sul americano (Schauensee 1970) e para o Brasil (Pinto 1938, 1944, Sick 1984) registros regionais ainda são insuficientes para muitas espécies. Uma destas regiões no Brasil é a Centro Oeste e especificamen-

* Base de Pesquisas da Fauna do Pantanal (IBDF)

Endereço Atual: Dept. de Ecologia (INPA) CP.478, Manaus, 69.011, AM.

** Centro de Estudos de Aves Migratórias (CEMAVE-IBDF), Brasília 72.000, DF.

te o Pantanal Matogrossense. O Pantanal além de ser uma área localizada entre a Amazônia, o Planalto Central e o Chaco é uma via importante para aves migratórias (Antas, 1983) vindas do hemisfério norte e das partes norte e sul da América do Sul. Várias espécies migratórias, entre guirças, biguás, colhereiros, gaivotas, maçaricos e andorinhas nidificam no Pantanal.

Ecológicamente o Pantanal apresenta diferenças em composição de habitats em cada um dos vários municípios que abrange. Por isso listas regionais precisam ser elaboradas para futuras comparações.

Brown (1984) ao analisar a zoogeografia das espécies de borboletas e aves do Pantanal Matogrossense apresenta uma síntese das observações de vários pesquisadores que moraram ou visitaram a região. Informações gerais sobre quais habitats existem nas áreas periféricas e dentro do Pantanal estão disponíveis no trabalho. Entretanto, especificamente os diferentes habitats onde as aves podem ser observadas não estão discriminados para cada espécie.

O objetivo deste artigo é apresentar uma lista preliminar das espécies de aves existentes no Pantanal de Poconé, em Mato Grosso. Informações adicionais sobre os habitats, ocorrência e abundância (dados qualitativos) são apresentados. Esta lista resultou somente das observações de campo dos autores. O primeiro autor morou durante dois anos e meio e o segundo autor três anos, no Pantanal de Poconé.

MÉTODOS

As observações foram feitas entre 1982 e início de 1986 (Março no Município de Poconé, entre 16°S 56°W e 18°S 58°W), em várias fazendas (Fazenda Baía de Pedras, Fazendinha, Fazenda São João, Fazenda Ipiranga, Fazenda Rio Alegre, Fazenda Santa Isabel, Fazenda Jofre, Fazenda Acurizal, Fazenda Malhada), e mais intensivamente em áreas 1) ao longo das Rodovias Transpantaneira de Poconé à Porto Jofre, 2) de Poconé a Porto Cercado, 3) no rio Cuiabá de Porto Jofre até o encontro com o rio Paraguay, 4) e nas áreas dentro do Parque Nacional do Pantanal (Fig. 1).

Nós utilizamos binóculos (8x30, 7x50) e luneta (x30) para observações de campo, e redes ornitológicas armadas em diferentes habitats para captura, marcação e medidas de aves.

Os pantaneiros não tem nomes para todas as espécies de aves do Pantanal. Portanto os nomes regionais adotados pelo povo pantaneiro estão com "MT" entre parênteses, os restantes são nomes comuns utilizados para outras regiões do Brasil.

Os termos "raro" e "comum" são subjetivos e não são resultantes de estudos de dinâmica de população de cada espécie. "Raro" significa que indivíduos da referida espécie foram observados poucas vezes e em pequeno número. "Comum" significa que indivíduos da espécie foram observados repetidas vezes, podendo ou não estar em grandes concentrações. O termo sazonal significa que indivíduos daquela espécie foram observados somente durante um período do ano. As épocas de ocorrência (iniciais de cada mês estão colocadas entre parênteses) são apresentadas em intervalos dos meses nos quais as espécies foram observadas. Infelizmente ainda não temos dados para todas as espécies, então colocamos somente (s) na tabela.

Como lista de referência elaborada por sistematistas utilizamos o livro de Meyer de Schauensee (1970), mesmo contendo nomes desatualizados, para orientar a lista apresentada neste estudo.

Os nomes comuns utilizados para outras regiões do Brasil foram tirados dos livros de Sick (1984) e Frisch (1981).

Os habitats estão definidos. A seguir apresentamos um mapa com os pontos de observação de aves com a lista da localização de cada ponto dentro do município de Poconé.

RESULTADOS

A tabela 1 mostra a lista das espécies de aves do Pantanal de Poconé. No total são 317 espécies de 60 famílias. Deste total 86 (27.1%) espécies são de ocorrência sazonal e as restantes 231 (72.9%) ocorrem durante todo o ano e portanto parecem ser residentes.

Entre as espécies aquícolas foram registradas 60 (18,9%) sendo que 35 destas (58,3%, e 11,0% do total para o Pantanal) são sazonais e parecem ser migratórias.

As famílias Tyrannidae e Fringilidae foram as que mostraram o maior número de espécies em relação ao total de espécies: vinte e duas famílias (36,6%) contêm apenas uma espécie. Dezoito famílias (29,5%) e 143 espécies (45,1%) foram da ordem Passeriformes, e 43 (70,5%) famílias e 174 espécies (54,9%) foram de 18 ordens de não passeriformes.

Principais áreas, com os respectivos habitats, onde as aves foram observadas:

1. Fazendinha, km 66 da Rodovia Cuiabá-Poconé mata semidecídua, cerrado, cerradão, campos (não alagáveis), áreas cultivadas (plantações);
2. Fazenda Baía de Pedras - pantanal de cerrado, baías, cerrado, áreas cultivadas (pastagens);
3. Rio Bento Gomes, nas proximidades da estrada Poconé-Porto Cercado - rio e brejos;
4. Rio Cuiabá praias do rio e áreas cultivadas (plantações e pastagens) próximo a Porto Cercado;
5. Rodovia Transpantaneira Poconé-Porto Jofre, km 14 - cerradão, campos e cerrado;
6. Posto de Fiscalização, km 17 - cerrado, corixos, áreas cultivadas (pastagens);
7. Rodovia Transpantaneira, km 19 ilhas de mata semidecídua, campos alagáveis;
8. Rodovia Transpantaneira, km 30 - mata semidecídua, campos alagáveis, e áreas cultivadas (pastagens), até 2 km da rodovia.
9. Rodovia Transpantaneira, km 40 - matas semidecíduas e campos alagáveis, até 3 km saindo da rodovia;
10. Rodovia Transpantaneira, km 59 - corixos e áreas cultivadas (pastagens), até 6 km saindo da rodovia;
11. Rio Pixaim, km 61 - margens do rio, cerrado, e campos (não alagáveis), até 4 km saindo da rodovia;
12. Rio Cassange, km 79 mata ciliar, brejos, campos alagáveis, até 5 km saindo da rodovia;
13. Rio Cassange, km 81 - mata ciliar, áreas cultivadas (pastagens), até 2 km saindo da estrada;
14. Rodovia Transpantaneira, km 95 campos alagáveis, corixos e brejos, até 2 km saindo da estrada;
15. Fazenda Rio Alegre, entre os km 105 e 108 brejos, baías, matas semidecíduas, e áreas cultivadas (pastagens), até 5 km saindo da rodovia;
16. Fazenda Santa Cruz, km 111 mata semidecídua, até 7 km saindo da rodovia na trilha (interior da mata) para a sede da fazenda;
17. Base de pesquisas da Fauna do Pantanal (IBDF), km 111 - mata ciliar do Rio Alegre, mata semidecídua, baía grande de rio, campos alagáveis;
18. Fazenda Santa Isabel, ao lado de toda a estrada (13 km) saindo da rodovia até a sede - mata semidecídua, Baía do Barreirão, campos alagáveis;
19. Fazenda Jofre, km 115 - mata semidecídua e campos alagáveis, até 10 km saindo da rodovia para a direção oeste;
20. Fazenda Jofre, km 120 campos alagáveis com matas de cambarás, até 3 km saindo da estrada para leste e oeste.
21. Fazenda Jofre, entre km 125 e km 140 - campos alagáveis, matas semidecíduas, corixos, até 5 km para cada lado da rodovia;
22. Fazenda Jofre, km 143 - matas semidecíduas e corixos, até 3 km de cada lado da rodovia;
23. Rio Cuiabá, Porto Jofre mata semidecídua e ciliar, campos alagáveis, beira do rio, áreas cultivadas (pastagens) em um raio de até 3 km do porto;
24. Rio Cuiabá - manchas de mata ciliar, praias e áreas cultivadas (plantações), até 2 km das margens do rio;
25. Rio Cuiabá mata ciliar, vegetação aquática sobre o rio, brejos, até 1 km das margens do rio;
26. Rio Cuiabá - brejos e mata ciliar, até 500 m das margens do rio;
27. Rio Cuiabá baías e corixos, até 1 km da beira do rio

28. Parque Nacional do Pantanal (IBDF), no encontro do Rio Cuiabá com o Rio Paraguai - mata ciliar, encostas do Morro do Caracará, baía próxima;
29. Fazenda Acurizal, margens do rio Paraguai - cerrado e áreas cultivadas (pastagens), margens do rio.

DEFINIÇÕES FISIONÔMICAS DOS HABITATS

mc - Mata Ciliar

Formação vegetal, composta principalmente de árvores altas, com trepadeiras e epífitas (bromélias e orquídeas) distribuída ao longo das margens de rios e corixos. Pode ser alagada durante inundações ou enchentes.

ms Mata Semidecídua

Formação vegetal, composta principalmente de árvores que perdem parcial ou totalmente as suas folhas durante a estação climática seca. No pantanal estão localizadas principalmente em áreas mais elevadas como as chamadas localmente “cordilheiras” e em áreas montanhosas, “morrarias”.

e Cerrado

Formação vegetal com o estrato arbóreo apresentando altura cerca de 3 metros normalmente, contendo espécies com o tronco recortado e de casca grossa. Apresenta ainda os estratos arbustivo e herbáceo (principalmente gramíneas e ciperáceas).

r - Rio

Corpos d'água lóticos (lineares) e sinuosos normalmente com mata nas margens. São perenes e contínuos mesmo durante a estação seca.

b Baía

Corpos d'água lênticos, normalmente circulares ou elípticos circundados por matas ou cerrado, que permanecem com água após a vazante do pantanal, represando assim grande quantidade de peixes. Não são muito profundas e chegam a apresentar um comprimento superior a 1 km.

j - Brejo

Ambiente permanentemente alagado, de menores dimensões que as “Baías”, com pouca profundidade e coberto em quase toda a sua extensão com plantas aquáticas na superfície e no fundo.

i - Campo Inundável

Campos com estrato herbáceo, que durante a estação chuvosa alagam-se, podendo ter ilhas de arbustos e árvores (murunduns), ilhas de matas (capões), além de áreas elevadas não alagáveis formando pequenas praias.

x Corixo

Corpos d'água lóticos (lineares) e sinuosos como um rio, que durante a estação seca apresenta diversos trechos interrompidos. Interligam “baías” entre si e rios.

p - Pastagens

Áreas alteradas em fazendas, para plantações de pastagens, fruticultura e agricultura em geral.

TABELA 1. Lista das Espécies de Aves do Pantanal de Poconé, MT.

Habitats		Abundância e Ocorrência	
mc	- mata ciliar	c - comum	
ms	- mata semidecídua	r - raro	
e	- cerrado	s - sazonal	
r	- rio	t - ocorre o ano inteiro	
b	- baía		
j	- brejo		
i	- campo inundável		
x	- corixo		
p	- pastagens		

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
RHEIDAE				
<i>Rhea americana</i>	Ema	Great Rhea	p, i	c (t)
TINAMIDAE				
<i>Crypturellus undulatus</i>	Jaó (MT)	Undulated Tinamou	mc, ms	c (t)
<i>Crypturellus parvirostris</i>	Inambú-chororó	Small-billed Tinamou	mc, ms	c (t)
PODICIPEDIDAE				
<i>Podiceps dominicus</i>	Mergulhãozinho	Least Grebe	r, b	r (t)
PHALACROCORACIDAE				
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	Biguá (MT)	Neotropic Cormorant	r,b,x,i	c (t)
ANHINGIDAE				
<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga (MT)	Anhinga	r,b,x,i	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
ARDEIDAE				
<i>Ardea cocoi</i>	Maguari (MT)	White-necked Heron	r, b, x, i	c (t)
<i>Casmerodius albus</i>	Garça-branca-grande (MT)	Great Egret	r, b, x, i	c (t)
<i>Egretta thula</i>	Garça-branca-pequena (MT)	Snowy Egret	r, b, x, i	c (s-Mai-Nov)
<i>Florida caerulea</i>	Garça-azul	Little Blue Heron	r, b, i	r (s)
<i>Butorides striatus</i>	Socózinho (MT)	Striated Heron	r, b, j, x	c (t)
<i>Bubulcus ibis</i>	Garça-vaqueira (MT)	Cattle Egret	p	c (s-Abr-Set)
<i>Syrigma sibilatrix</i>	Garça-real	Whistling Heron	p, j	c (s-Mai-Out)
<i>Ptilherodius pileatus</i>	Maria-faccira	Capped Heron	j, x, b, i	r
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Boca-d'água	Black-crowned Night-Heron	r, b, x	c (s-Abr-Dez)
<i>Tigrisoma lineatum</i>	Socó-boi (MT)	Rufescent Tiger-Heron	b, x, j, r	c (t)
<i>Ixobrychus exilis</i>	Socózinho (MT)	Least Bittern	x	r
COCHELEARIIDAE				
<i>Cochlearius cochlearius</i>	Arapapá	Boat-billed Heron	x, i	r (s-Mai-Out)
CICONIIDAE				
<i>Mycteria americana</i>	Cabeça-seca (MT)	Wood-Stork	r, b, x, i	c (s-Abr-Dez)
<i>Euxenura maguari</i>	Tabuiaí (MT)	Maguari Stork	b, x, i	r (s-Abr-Dez)
<i>Jabiru mycteria</i>	Tuiuiu (MT)	Jabiru	r, b, x, i	c (s-Abr-Dez)
THRESKIORNITHIDAE				
<i>Harporhynchus caeruleus</i>	Curicaca-cinza (MT)	Plumbeous Ibis	b, x, j, i	c (t)
<i>Theristicus caudatus</i>	Curicaca (MT)	Buff-necked Ibis	j, p, i	c (t)
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Chapéu-velho (MT)	Green Ibis	r, b, j, i	c (s-Mai-Dez)
<i>Phimosus infuscatus</i>	Frango d'água (MT)	Bare-faced Ibis	b, x, j, i	c (s-Mai-Dez)
<i>Plegadis chihli</i>	Caratuna	White-faced Ibis	b, x, i	c (s-Abr-Dez)
<i>Ajaia ajaja</i>	Colhereiro (MT)	Rosate Spoonbill	r, b, x, i, j	c (s-Mai-Dez)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
ANIMIDAE				
<i>Chauna torquata</i>	Tachã, anhuema (MT)	Southern Screamer	r, b, x, i	c (t)
ANATIDAE				
<i>Dendrocygna viduata</i>	Irerê (MT)	White-faced Whistling-Duck	b, i, p	c (t)
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Marreca-cabocla	Black-bellied Whistling-Duck	ms, b, i, p	c (t)
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Sinházinha (MT)	Fulvous Whistling-Duck	b, i, p	r (s-Mai-Dez)
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Sinhá (MT)	Brazilian Duck	b, x, i, p	c (t)
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Pato-de-crista	Comb Duck	b, x, i	r (s)
<i>Cairina moschata</i>	Pato-do-mato	Muscovy Duck	ms, r, b, i, p	c (t)
CATHARTIDAE				
<i>Sarcorampus papa</i>	Urubu-rei (MT)	King Vulture	ms	r (t)
<i>Coragyps atratus</i>	Ububu	Black Vulture	ms, mc, r, b, p	c (t)
<i>Cathartes aura</i>	Urubu-de-cabeça-vermelha (MT)	Turkey Vulture	ms, mc, r, p	c (t)
<i>Cathartes burrovianus</i>	Urubu-de-cabeça-amarela	Lesser Yellow-headed Vulture	ms, r, p	c (t)
ACCIPITRIDAE				
<i>Elanus leucurus</i>	Gavião-peneira	White-tailed Kite	mc	r
<i>Gampsonyx swainsonii</i>	Gaviãozinho (MT)	Pearl Kite	ms, mc	r (t)
<i>Elanoides forficatus</i>	Gavião-tesoura	Swallow-tailed Kite	ms, mc	r (s)
<i>Leptodon cayanensis</i>	Gavião-de-cabeça-cinza	Gray-headed Kite	ms, mc	r
<i>Rosrhamnus sociabilis</i>	Gavião-caramujeiro (MT)	Snail Kite	r, b, x, j, i	c (s-Abr-Out)
<i>Accipiter bicolor</i>	Gavião-caçador-bicolor	Bicolored Hawk	mc, ms	r (t)
<i>Accipiter striatus</i>	Gavião-caçador	Sharp-shinned Hawk	mc, ms	r (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Buteo albicaudatus</i>	Corocuturi	White-tailed Hawk	mc, ms	r
<i>Buteo albonotatus</i>	Gavião-rabo-barrado	Zone-tailed Hawk	ms	r (t)
<i>Buteo magnirostris</i>	Gavião-carijó (MT)	Roadside Hawk	mc, ms, x	c (t)
<i>Busarellus nigricollis</i>	Gavião-belo (MT)	Black-collared Hawk	r, b, x, i	c (t)
<i>Heterospizias meridionalis</i>	Gavião-caboclo	Savanna Hawk	mc, ms, b, x, p	c (t)
<i>Buteogallus urubitinga</i>	Gavião-preto (MT)	Great Black Hawk	mc, ms, b, x	c (t)
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Gavião-pato	Black and White Hawk-Eagle	mc, ms	r
<i>Spizaetus ornatus</i>	Gavião-de-penacho	Ornate Hawk-Eagle	mc, ms	r (t)
<i>Geranospiza caerulescens</i>	Gavião-mateiro (MT)	Crane Hawk	mc, ms, b, x	r (t)
PANDIONIDAE				
<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pescadora	Osprey	r, b, i	c (s)
FALCONIDAE				
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Acauã (MT)	Laughing Falcon	mc, ms, p	c (t)
<i>Micrastur semitorquatus</i>	Mancauã (MT)	Collared Forest-Falcon	mc, ms	r (t)
<i>Milvago chimachima</i>	Carapateiro	Yellow-headed Caracara	mc, ms, p	c (t)
<i>Polyborus plancus</i>	Caracará	Crested Caracara	mc, ms, r, b, i	c (t)
<i>Falco ruficularis</i>	Falcão (MT)	Bat Falcon	mc, ms, p	r (t)
<i>Falco femoralis</i>	Falcão-de-coleira	Aplomado Falcon	mc, ms, p	r (t)
<i>Falcon sparverius</i>	Falcão-quiriquiri	American Kestrel	mc, ms, p	c (t)
CRACIDAE				
<i>Penelope ochrogaster</i>	Jacucaca (MT)	Chestnut-bellied Guan	mc, ms	r (t)
<i>Penelope supercilialis</i>	Jacugoela (MT)	Rusty-margined Guan	mc, ms	r (t)
<i>Pipile pipile</i>	Jacutinga (MT)	Blue-throated Piping Guan	mc, ms	c (t)
<i>Oriolus canicollis</i>	Aracuaã (MT)	Chaco Chachalaca	mc, ms	c (t)
<i>Crax fasciolata</i>	Mutum (MT)	Bare-faced-Curassow	mc, ms	c

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
ARAMIDAE				
<i>Aramus guarauna</i>	Carão (MT)	Limpkin	r, b, x, i, j	c (t)
RALLIDAE				
<i>Aramides cajana</i>	Saracura (MT)	Gray-necked Wood-Rail	mc, ms, b, x, j	c (t)
<i>Rallus nigricans</i>	Saracura-preta (MT)	Blackish Rail	r, b, x, i, j	r (s)
<i>Porzana albicollis</i>	Saracura-sanã	Ash-throated Crake	b, x, j	r
<i>Neocrex erythrops</i>	Pinto dagua (MT)	Paint-billed Crake	b, x, j, i	r (s)
<i>Porphyryla martinica</i>	Frango-dagua-azul	Purple Gallinule	b, x, j, i	r (s-Jan-Jul)
<i>Porphyryla flavivestris</i>	Frango-dagua-pequeno	Azure Gallinule	b, x, j, i	r (s)
HELIORNITHIDAE				
<i>Helionis fulica</i>	Picaparra	Sungrebe	mc, ms, b, x	r (t)
EURYPYGIDAE				
<i>Eurypyga helias</i>	Pavãozinho (MT)	Sunbittern	mc, ms, b, x, j	c (t)
CARIAMIDAE				
<i>Cariama cristata</i>	Seriema (MT)	Red-legged Seriema	i, p	r (t)
JACANIDAE				
<i>Jacana jacana</i>	Cafézinho (MT)	Wattled Jacana	r, b, x, i, j	c (t)
CHARADRIDAE				
<i>Vanellus chilensis</i>	Quero-quero (MT)	Southern Lapwing	r, b, x, i, p	c (t)
<i>Hoploxypterus cayananus</i>	Mexeriqueira	Pied Lapwing	r, b, x, i	c (s-Mar-Sep)
<i>Charadrius collaris</i>	Maçarico-de-coleira	Collared Plover	r, b, x, i	c (s-Jan-Jul)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
SCOLOPACIDAE				
<i>Tringa solitaria</i>	Maçarico solitário	Solitary Sandpiper	r,b,x,i	c (s-Abr-Out)
<i>Tringa flavipes</i>	Maçarico (MT)	Lesser Yellowlegs	r,b,x,i	r (s-Abr-Out)
<i>Actitis macularia</i>	Maçarico-pintado	Spotted Sandpiper	r,b,x,i	r (s-Abr-Out)
<i>Calidris canutus</i>	Maçarico	Red Knot	i	r (s-Abr-Out)
<i>Calidris minutilla</i>	Maçarico	Least Sandpiper	r	r (s)
<i>Calidris fuscicollis</i>	Maç.-de-sobre-branco	White-rumped Sandpiper	r, i	r (s-Mar-Abr)
<i>Calidris melanotos</i>	Maçarico-de-colete	Pectoral Sandpiper	r,b,x,i	r (s-Mar-Jun)
<i>Gallinago gallinago</i>	Narceja (MT)	Common Snipe	b,x,i	c (t)
RECURVIROSTRIDAE				
<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo	Common Stilt	b,x,i	c (s)
LARIDAE				
<i>Phaetusa simplex</i>	Gaivota (MT)	Large-billed Tern	r,b,x,i	c (s-Abr-Set)
<i>Sterna supercilialis</i>	Gaivotinha (MT)	Yellow-billed Tern	r,b,x,i	c (s-Abr-Out)
<i>Sterna hirundo</i>	Gaivota (MT)	Common Tern	i, r	r (s-Jul-Ago)
RYNCHOPIDAE				
<i>Rynchops niger</i>	Taiamã (MT)	Black Skimmer	r,b,x,i	r (s-Mai-Out)
COLUMBIDAE				
<i>Columba picazuro</i>	Asa-branca (MT)	Picazuro Pigeon	mc, ms, p	c (s-Mar-Dez)
<i>Columba cayennensis</i>	Pomba-pocaçu	Pale-vented Pigeon	mc, ms, p	c (t)
<i>Geotrygon montana</i>	Juriti-vermelha	Ruddy Quail-Dove	mc, ms	r (t)
<i>Zenaidura macroura</i>	Avoante	Eared Dove	ms, p	r (s-Abr-Set)
<i>Scardafella squamata</i>	Fogo-apagou	Scaled Dove	ms, p	r (t)
<i>Leptotila verreauxi</i>	Juriti (MT)	White-tipped Dove	mc, ms, p	c (t)
<i>Leptotila rufaxilla</i>	Juriti (MT)	Gray-fronted Dove	mc, ms	r (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Claravis pretiosa</i>	Rola-azul	Blue Ground-Dove	mc, ms, p	c (t)
<i>Uropelia campestris</i>	Rola-vaqueira (MT)	Long-tailed Ground-Dove	p	c (t)
<i>Columbina talpacoti</i>	Rolinha (MT)	Ruddy Ground-Dove	mc, ms, p	c (t)
<i>Columbina picui</i>	Rolinha (MT)	Picui Ground-Dove	mc, ms, p	c (t)
PSITTACIDAE				
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	Arara-azul (MT)	Hyacinthine Macaw	mc, ms	c (t)
<i>Ara chloroptera</i>	Arara-vermelha (MT)	Red-and-green Macaw	mc, ms	r
<i>Ara ararauna</i>	Arara (MT)	Blue-and-yellow Macaw	ms, mc	r
<i>Ara nobilis</i>	Arará-nanica	Red-shouldered Macaw	ms, mc	r (t)
<i>Ara auricollis</i>	Ararinha (MT)	Golden-collared Macaw	mc, ms, p	c (t)
<i>Aratinga acuticaudata</i>	Jandaia-da-cabeça-azul	Blue-crowned Parakeet	mc, ms, e, p	c (s)
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Araua-i (MT)	White-eyed Parakeet	mc, ms, e, p	c (s-Nov-Mai)
<i>Aratinga aurea</i>	Nandaia (MT)	Peach-fronted Parakeet	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Nandayus nenday</i>	Periquito-de-cabeça-preta	Black-hooded Parakeet	mc, ms, e, p	r (t)
<i>Myiopsitta monachus</i>	Periquito do papo branco (MT)	Monk Parakeet	e, p	c (t)
<i>Brotogeris versicolurus</i>	Periquito	Canary-winged Parakeet	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Amazona amazonica</i>	Papagaio (MT)	Orange-winged Parrot	mc, ms, p	c (t)
<i>Amazona aestiva</i>	Papagaio (MT)	Turquoise-fronted Parrot	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Amazona xanithops</i>	Papagaio (MT)	Yellow-faced Parrot	ms, mc	r (s)
<i>Pionus maximiliani</i>	Baitaca	Scaly-headed Parrot	mc, ms, e, p	c (t)
CUCULIDAE				
<i>Piaya cayana</i>	Alma-de-gato	Squirrel Cuckoo	mc, ms, p	c
<i>Piaya minuta</i>	Chincoã-pequeno	Little Cuckoo	mc, ms	r
<i>Crotophaga major</i>	Anú-coroca	Greater Ani	ms, mc, j	c (s-Nov-Abr)
<i>Crotophaga ani</i>	Anú-preto	Smooth-billed Ani	e, p	c
<i>Guira guira</i>	Anú-branco	Guira Cuckoo	ms, e, p	c
<i>Tapera naevia</i>	Sacé	Striped Cuckoo	ms, e, p	r

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
TYTONIDAE <i>Tyto alba</i>	Suindara	Barn Owl	mc,ms,e	r (t)
STRIGIDAE <i>Otus chlotiba</i> <i>Bubo virginianus</i> <i>Pulsatrix perspicillata</i> <i>Glaucidium brasilianum</i> <i>Speotyto cunicularia</i>	Corujinha João-curutu (MT) Murucutu (MT) Caburé Coruja-buraqueira	Tropical Screech-Owl Great Horned Owl Spectacled Owl Ferruginous Pygmy-Owl Burrowing Owl	ms,mc,e,p mc,ms,e,p mc,ms,e,p mc,ms,e,p e,p	r (t) c (t) r (t) c (t) c (t)
NYCTIBIIDAE <i>Nyctibius grandis</i> <i>Nyctibius griseus</i>	Urutau Mãe-da-lua	Great Potoo Common Potoo	mc,ms,e mc,ms,e,p	r c (t)
CAPRIMULGIDAE <i>Chordeiles pusillus</i> <i>Nyctiprogne leucopyga</i> <i>Podager nacunda</i> <i>Nyctidromus albigollis</i> <i>Caprimulgus parvulus</i> <i>Caprimulgus rufus</i> <i>Hydropsalis brasiliiana</i>	Bacurauzinho Bacurau-cauda-barrada Curangú (MT) Mede-légua (MT) Bacurau-pequeno João-corta-pau (MT) Bacurau-tessoura	Least Nighthawk Band-tailed Nighthawk Nacunda Nighthawk Pauraque Little Nightjar Rufous Nightjar Scissor-tailed Nightjar	e,p ms,e,p e,p e,p e,p e,p e,p	c (s-Mai-Set) c (r-Mai-Out) c (s-Abr-Out) c (s-Abr-Out) c (s-Abr-Out) c (s-Abr-Out) r (s-Mai-Out)
APODIDAE <i>Chaetura andrei</i>	Andorinhão-do-temporal	Ashy-tailed Swift	mc,ms,e	r (s-Dez-Abr)
TROCHILIDAE <i>Glaucis hirsuta</i> <i>Phaethornis pretrei</i>	Beija-flor (MT) Beija-flor (MT)	Rufous-breasted Hermit Planalto Hermit	mc,ms,e mc,ms,e	c (s-Abr-Set) c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Phaethornis subochraceus</i>	Beija-flor (MT)	Buff-bellied Hermit	mc, ms	c (t)
<i>Phaethornis ruber</i>	Beija-flor (MT)	Reddish Hermit	mc, ms,e	r (t)
<i>Thalurania furcata</i>	Beija-flor (MT)	Fork-tailed Woodnymph	mc,ms,e	c (s-Abr-Set)
<i>Hylocharis sapphirina</i>	Beija-flor (MT)	Rufous-throated Sapphire	mc, ms	r (s-Abr-Set)
<i>Hylocharis chrysura</i>	Beija-flor (MT)	Gilded Hummingbird	mc,ms,e	c
<i>Polymis guainumbi</i>	Beija-flor (MT)	White-tailed Goldenthroat	mc, ms	c (s-Abr-Set)
<i>Anazilia versicolor</i>	Beija-flor (MT)	Versicolored Emerald	mc,ms,e	r
<i>Anazilia fimbriata</i>	Beija-flor (MT)	Glittering-throated Emerald	mc, ms	c (s-Abr-Set)
<i>Helimaster furcifer</i>	Beija-flor (MT)	Blue-tufted Starthroat	e	r (t)
TROGONIDAE				
<i>Trogon curucui</i>	Surucua-de-barriga-vermelha	Blue-crowned Trogon	mc, ms	c (t)
ALCEDINIDAE				
<i>Ceryle torquata</i>	Martim-pescador-grande	Ringed Kingfisher	r,b,x,j,i	c (t)
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martim-pescador-verde	Amazon Kingfisher	r,b,x,j,i	c (t)
<i>Chloroceryle americana</i>	Martim-pescador (MT)	Green Kingfisher	r,b,x,j,i	c (t)
<i>Chloroceryle inda</i>	Martim-pescador (MT)	Green-and-rufous Kingfisher	r,b,x,j,i	r (t)
<i>Chloroceryle aenea</i>	Martinzinho (MT)	Pygmy Kingfisher	r,b,x,j,i	r (t)
MOMOTIDAE				
<i>Momotus momota</i>	Udú (MT)	Blue-crowned Motmot	mc, ms	r (t)
GALBULIDAE				
<i>Galbula ruficauda</i>	Bico-de-agulha (MT)	Rufous-tailed Jacamar	mc, ms	c (t)
BUCCONIDAE				
<i>Nystalus maculatus</i>	Bico-de-lata (MT)	Spot-backed Puffbird	ms, e	r (t)
<i>Monasa nigrifrons</i>	Chora-chuva (MT)	Black-fronted Nunbird	mc, ms	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
RAMPHASTIDAE				
<i>Pteroglossus castanotis</i>	Tucaninho (MT)	Chestnut-eared Aracari	mc, ms	c (t)
<i>Ramphastos toco</i>	Tucano (MT)	Toco Toucan	mc,ms,p	c (t)
PICIDAE				
<i>Picumnus minutissimus</i>	Picapauzinho (MT)	Arrowhead Piculet	mc,ms,e	r (t)
<i>Colaptes campestris</i>	Pica-pau-do-campo	Campo Flicker	e, p	c (t)
<i>Chrysomitris melanochloros</i>	Pica-pau-dourado	Green-barred Woodpecker	mc,ms,e	r (t)
<i>Piculus chrysoclorus</i>	Pica-pau-dourado-escuro	Golden-green Woodpecker	mc,ms,e	r (t)
<i>Ceileus flavescens</i>	Pica-pau-de-cabeça-amarela	Blond-crested Woodpecker	mc, ms	r (t)
<i>Dryocopus lineatus</i>	Pica-pau (MT)	Lineated Woodpecker	mc, ms	c (t)
<i>Leuconerpes candidus</i>	Pica-pau-branco	White Woodpecker	e, p	r (t)
<i>Veniliornis passerinus</i>	Picapauzinho (MT)	Little Woodpecker	mc,ms,e	c (t)
<i>Phloeocastes melanoleucos</i>	Pica-pau (MT)	Crimson-crested Woodpecker	mc, ms	c (t)
DENDROCOLAPTIDAE				
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapaçu-verde	Olivaceous Woodcreeper	mc,ms,e	c (t)
<i>Xiphocolaptes major</i>	Pica-pau (MT)	Great Rufous Woodcreeper	mc,ms,e	r (t)
<i>Dendrocolaptes platystris</i>	Arapaçu-grande	Planoalto Woodcreeper	mc,ms,e	r (t)
<i>Xiphorhynchus picus</i>	Pica-pau (MT)	Straight-billed Woodcreeper	mc, ms	r (t)
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Pica-pau (MT)	Buff-throated Woodcreeper	mc, ms	c (t)
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Arapaçu-do-cerrado	Narrow-billed Woodcreeper	mc, e	r (t)
<i>Campylorhamphus trochilostriis</i>	Arapaçu-do-bico-torto	Red-billed Scythebill	mc,ms,e	c (t)
FURNARIIDAE				
<i>Furnarius rufus</i>	Amassa barro (MT)	Rufous Hornero	ms,mc,e,p	c (t)
<i>Furnarius leucopus</i>	Amassa barro do brejo (MT)	Pale-legged Hornero	mc, ms	c (t)
<i>Schoenophylax phryganophila</i>	Bichoita	Chotoy Spinetail	e, i, p	r (t)
<i>Synallaxis guianensis</i>	João-teneném-beçuá	Plain-crowned Spinetail	mc, ms, p	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Synallaxis frontalis</i>	Petrim	Sooty-fronted Spinetail	e, i, p	r (t)
<i>Synallaxis hypospodia</i>	João-teneném	Cinereous-breasted Spinetail	e, p	r (t)
<i>Certhia cinnamomea</i>	Curatié	Yellow-throated Spinetail	i	r (t)
<i>Cranioleuca vulpina</i>	Arredio-do-rio	Rusty-backed Spinetail	e, i	r (t)
<i>Phacellodomus rufifrons</i>	João-de pau	Rufous-fronted Thornbird	e, p	r (t)
<i>Phacellodomus ruber</i>	Graveteiro	Greater Thornbird	e, p	c (t)
<i>Pseudoseiura cristata</i>	Casca-de-couro	Rufous Cacholote	ms,e,p	r (t)
<i>Hylocryptus rectirostris</i>	Fura-barreira	Chestnut-capped Foliage-gleaner	ms	r (t)
<i>Xenops rutilans</i>	Bico-virado-carijó	Streaked Xenops	ms, e	r (t)
FORMICARIIDAE				
<i>Taraba major</i>	Chocão-de-barriga-branca	Great Antshrike	mc, ms	c (t)
<i>Thamnophilus doliatus</i>	Nhanacocá (MT)	Barred Antshrike	ms	c (t)
<i>Thamnophilus punctatus</i>	Sanacocá (MT)	Slaty Antshrike	ms, e	r (t)
<i>Dysithamus mentalis</i>	Choca-olivacea	Plain Antvireo	mc, ms	r (t)
<i>Myrmorchilus strigilatus</i>	Formigueiro-pintalgado	Stripe-backed Antbird	mc, ms	r (t)
<i>Herpilochmus longirostris</i>	Formigueiro-de-bico-longo	Large-billed Antwren	mc, ms	r (t)
<i>Formicivora rufa</i>	Papa-formigas-vermelha	Rusty-backed Antwren	mc,ms,j	c (t)
<i>Cercomacra melanaria</i>	Chororó-do Pantanal	Mato Grosso Antbird	mc, ms	c (t)
<i>Conopophaga lineata</i>	Chupa-dente	Rufous Gnateater	mc, ms	r (t)
COTINGIDAE				
<i>Tityra cayana</i>	Anambé-branco-de-rabo-preto	Black-tailed Tityra	mc, ms	c (t)
<i>Tityra inquisitor</i>	Anambé (MT)	Black-crowned Tityra	mc, ms	r (t)
<i>Pachyrhamphus polychopterus</i>	Caneleirinho-preto	White-winged Becard	mc, ms	r (t)
<i>Pachyrhamphus viridis</i>	Caneleirinho-verde	Green-backed Becard	mc, ms	r (t)
PIPRIDAE				
<i>Antilophia galeata</i>	Soldadinho	Helmeted Manakin	mc, ms	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
TYRANNIDAE				
<i>Xolmis cinerea</i>	Maria-branca	Gray Monjita	e, p	c (s-Out-Mar)
<i>Xolmis velata</i>	Noivinha-branca	White-rumped Monjita	c, i, p	r (s-Out-Mar)
<i>Xolmis irupero</i>	Noivinha	White Monjita	b, x, j, i	r (s-Out-Mar)
<i>Fluvicola pica</i>	Lavadeira (MT)	Pied Water-Tyrant	r, b, x, j, i	c (s-Ago-Mar)
<i>Arundinicola leucocephala</i>	Veinho (MT)	White-headed Marsh-Tyrant	r, b, x, j, i	c (s-Out-Mai)
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	São-Joãozinho (MT)	Vermilion Flycatcher	r, b, x, i, e	r (s-Ago-Fev)
<i>Salpapa icterophrys</i>	Suiriri-pequeno	Yellow-browed Tyrant	mc, ms, e	r (s-Jul-Jan)
<i>Machetornis rixosus</i>	Bem-te-vi-do-gado	Cattle Tyrant	r, j, i, e, p	c (t)
<i>Muscivora tyrannus</i>	Tesoura	Fork-tailed Flycatcher	mc, ms, e, p	r (s-Ago-Mar)
<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suiriri	Tropical Kingbird	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Legatus leucophaeus</i>	Bem-te-vi-pirata	Piratic Flycatcher	mc, ms	c (s-Out-Abr)
<i>Megarhynchus pitangua</i>	Bem-te-vi-bico-chato	Boat-billed Flycatcher	mc, ms	c (s-Jul-Fev)
<i>Myiodynastes maculatus</i>	Bem-te-vi-rajado	Streaked Flycatcher	mc, ms	c (s-Ago-Fev)
<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Bem-te-vizinho-de-asa-ferrugínea	Rusty-margined Flycatcher	mc, ms	c (t)
<i>Myiozetetes similis</i>	Bem-te-vizinho-penacho-vermelho	Vermilion-crowned Flycatcher	ms, j, r	r (t)
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bem-te-vi (MT)	Great Kiskadee	mc, ms, b, j, e, p	c (t)
<i>Pitangus litor</i>	Bentevizinho	Lesser Kiskadee	r, x, j	r (t)
<i>Attila bolivianus</i>	Tinguaçu-parda	Dull-capped Attila	mc, ms	r (t)
<i>Casiornis rufa</i>	Caneleiro	Rufous Casiornis	mc, ms	r (s-Jul-Jan)
<i>Myiarchus ferox</i>	Maria-cavaleira	Short-crested Flycatcher	mc, ms	c (t)
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Brown-crested Flycatcher	mc, ms	c (s-Jul-Fev)
<i>Contopus cinereus</i>	Papa-mosca-cinzentos	Tropical Pewee	mc, ms	r (s-Out-Mar)
<i>Empidonax euleri</i>	Enferrujado	Euler's Flycatcher	mc, ms	r (s-Jul-Jan)
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Papa-mosca-castanho	Fuscos Flycatcher	mc, ms	c (t)
<i>Myiophobus fasciatus</i>	Felipe	Bran-Colored Flycatcher	mc, ms	r (t)
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Mosquiteiro-oliváceo	Yellow-olive Flycatcher	mc, ms	r (t)
<i>Todirostrum cinereum</i>	Ferreirinho	Common Tody-Flycatcher	mc, ms	c (t)
<i>Todirostrum latirostre</i>	Ferreirinho ferrugíneo	Rusty-fronted Tody-Flycatcher	ms	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Idioptilon siriaticolle</i>	Sebinho-rajado-amarelo	Stripe-necked Tody-Tyrant	mc, ms	r (t)
<i>Idioptilon margaritaceiventris</i>	Sebinho-de-olho-ouro	Pearl-vented Tody-Tyrant	mc, ms	c (t)
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	Barulhento	Tawny-crowned Pygmy-Tyrant	ms	r (t)
<i>Serpophaga subcristata</i>	Alegriño	White-crested Tyrannulet	mc, ms	c (s-Set-Fev)
<i>Elaenia flavogaster</i>	Guaracava-de-barriga-amarela	Yellow-bellied Elaenia	mc, ms, e	c (t)
<i>Myiopagis gainardii</i>	Guaracava	Forest Elaenia	ms	r (t)
<i>Myiopagis viridicincta</i>	Guaracava-de-orelhas	Greenish Elaenia	ms	r (t)
<i>Elaenia murina</i>	Papa-mosquito-murino	Mouse-colored Tyrannulet	mc, ms, e	r (t)
<i>Phacomysia murina</i>	Risadinha	Southern Beardless Tyrannulet	mc, ms	c (t)
<i>Campostoma obsoletum</i>	Cabeçudo	Sepia-capped Flycatcher	mc, ms	r (t)
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>				
HIRUNDINIDAE				
<i>Tachycineta albiventer</i>	Andorinha-do-rio	White-winged Swallow	r, b, x, j, i	c (t)
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Andorinha (MT)	White-rumped Swallow	r, b, x, j, i	c (s-Jul-Jan)
<i>Phaeoprogne tapera</i>	Andorinha (MT)	Brown-chested Martin	r, b, x, j, i	c (s-Out-Jan)
<i>Progne chalybea</i>	Andorinha-grande	Gray-breasted Martin	r, b, x, j, i	c (t)
<i>Progne subis</i>	Andorinha-purpura	Purple Martin	b, x, i	c (s-Dez-Mar)
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Andorinha (MT)	Rough-winged Swallow	i, p	c (t)
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha (MT)	Barn Swallow	x, i	c (s-Jan-Mai)
CORVIDAE				
<i>Cyanocorax cyanomelas</i>	Gralha (MT)	Purplish Jay	ms, e	c (t)
<i>Cyanocorax cristatellus</i>	Gralha-do-campo	Curly-crested Jay	e	r (t)
TROGLODYTIDAE				
<i>Campylorhynchus turdinus</i>	João-corta-pau (MT)	Thrush-like Wren	mc, ms	c (t)
<i>Thryothorus genibarbis</i>	Garricha	Moustached Wren	mc, ms	c (t)
<i>Thryothorus leucotis</i>	Garricha-de-peito-castanho	Buff-breasted Wren	mc, ms	c (t)
<i>Donacobius atricapillus</i>	Capivareiro (MT)	Black-capped Mockingthrush	r, b, x, j	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
MIMIDAE				
<i>Mimus saturninus</i>	Sabiá (MT)	Chalk-browed Mockingbird	e, p	c (t)
TURDIDAE				
<i>Turdus rufigiventris</i>	Sabiá-laranjeira	Rufous-bellied Thrush	mc, ms, p	c (t)
<i>Turdus leucomelas</i>	Sabiá-branco	Pale-breasted Thrush	mc, ms	r (t)
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Sabiá-poca	Creamy-bellied Thrush	mc, ms	c (s-Mai-Out)
SYLVIIDAE				
<i>Poliophtila dumicola</i>	Balança-rabo-de-máscara	Masked Gnatcatcher	e, p	c (t)
MOTACILLIDAE				
<i>Anthus lutescens</i>	Caminheiro-zumbidor	Yellowish Pipit	x, i, p	c (s-Abr-Out)
VIREONIDAE				
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Pitiguari	Rufous-browed Peppershrike	mc, ms	c (t)
<i>Vireo olivaceus</i>	Juruviara	Red-eyed Vireo	mc, ms	c (s-Out-Abr)
<i>Hylophilus pectoralis</i>	Juruviara-de-peito-amarelo	Ashy-headed Greenlet	mc, ms	r (t)
ICTERIDAE				
<i>Molothrus bonariensis</i>	Chopim	Shiny Cowbird	i, p	c (s-Jan-Jun)
<i>Molothrus badius</i>	Asa-de-telha	Bay-winged Cowbird	i, p	c (t)
<i>Psarocolius decumanus</i>	Japu (MT)	Crested Oropendola	mc, ms, p	c (t)
<i>Cacicus cela</i>	Japuirá (MT)	Yellow-rumped Cacique	mc, ms, p	c (t)
<i>Cacicus solitarius</i>	João-congo (MT)	Solitary black Cacique	mc, ms, j	c (t)
<i>Cacicus haemorrhous</i>	Guaxo	Red-rumped Cacique	mc, ms	r (t)
<i>Gnorimops chopi</i>	Pássaro-preto	Chopi Blackbird	e, p	c (t)
<i>Agelaius cyanopus</i>	Dorêmi-preto	Unicolored Blackbird	r,b,x,j,i	c (t)
<i>Icterus cayanensis</i>	Encontro	Epaulet Oriole	mc, ms	c (t)

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Icterus icterus</i>	João-pinto (MT)	Tropical	mc, ms, e, p	c
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	Capitão	Scarlet-headed Blackbird	x, j	r (s)
<i>Leistes superciliosus</i>	Polícia-inglesa	White-browed Blackbird	x, j	r (t)
PARULIDAE				
<i>Parula pitiayumi</i>	Mariquita	Tropical Parula	mc, ms	c (t)
<i>Basileuterus flavescens</i>	Mariquita amarelada	Flavescens Warbler	mc, ms	c (t)
<i>Basileuterus hypoleucus</i>	Mariquita-de-peito-branco	White-bellied Warbler	mc, ms	r (t)
<i>Coereba flaveola</i>	Cambacica	Bananaquit	x, j	c (t)
<i>Conirostrum speciosum</i>	Figueira-de-rabo-castanho	Chestnut-vented Conebill	e	c (t)
THRAUPIDAE				
<i>Euphonia chlorotica</i>	Vi-vi	Purple-Throated Euphonia	ms, e	c (t)
<i>Euphonia violacea</i>	Gaturamo-verdadeiro	Violaceous Euphonia	ms, e	c (t)
<i>Thraupis sayaca</i>	Sanhaço (MT)	Sayaca Tanager	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Thraupis palmarum</i>	Sanhaço do coqueiro	Palm Tanager	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Ramphocelus carbo</i>	Pipira-vermelha	Silver-beaked Tanager	mc, ms, e, p	c (t)
<i>Tachyphonus rufus</i>	Pipira-preta	White-lined Tanager	ms, e, p	r (t)
<i>Eucometis penicillata</i>	Pipira-da-taoca	Gray-headed Tanager	mc, ms	c (t)
<i>Nemosia pileata</i>	Saíra-de-chapéu-preto	Hooded Tanager	mc, ms	r (t)
<i>Thytopopsis sordida</i>	Saíra-canária	Orange-headed Tanager	mc, e	r (t)
FRINGILLIDAE				
<i>Saltator coerulescens</i>	Sabiá-gonga	Grayish Saltator	mc, ms, x, i	c (t)
<i>Saltator similis</i>	Trinca-ferro-verdadeiro	Green-winged Saltator	mc, ms, x	r (t)
<i>Saltator atricollis</i>	Bico-de-pimenta	Black-throated Saltator	ms, e	c (t)
<i>Paroaria coronata</i>	Galo-da-campina (MT)	Red-crested Cardinal	i, p	r (t)
<i>Paroaria capitata</i>	Cardeal (MT)	Yellow-billed Cardinal	i, p	c (t)
<i>Paroaria auroventris</i>	Bicudo-barriga-amarela	Black-backed Grosbeak	ms, p	r

Continua

	NOME COMUM	NOME EM INGLÊS	HABITAT	ABUNDÂNCIA E OCORRÊNCIA DURANTE O ANO
<i>Volatinia jacarina</i>	Tiziu	Blue-black Grassquit	e, i, p	c (s-Jan-Mai)
<i>Sporophila plumbea</i>	Patativa-Verdadeira	Plumbeous Seedeater	x,j,i,p	r (s-Jan-Mai)
<i>Sporophila collaris</i>	Coleiro-do-brejo	Rusty-collared Seedeater	r,b,x,j	c (s-Jan-Mai)
<i>Sporophila lineola</i>	Bigodinho	Lined Seedeater	x,j,i,p	c (s-Jan-Mai)
<i>Sporophila caerulescens</i>	Coleirinho	Double-collared Seedeater	x,j,i,p	c (s-Jan-Mai)
<i>Sporophila leucoptera</i>	Chorão	White-bellied Seedeater	x,j,i	c (s-Feb-Jun)
<i>Sporophila bouvreuil</i>	Caboclinho	Capped Seedeater	x,j,i,p	c (s-Feb-Mai)
<i>Oryzoborus angolensis</i>	Curio	Lesser Seed-Finch	mc, ms, e	c (t)
<i>Sicalis flaveola</i>	Canário-da-terra	Saffron Finch	ms, e, p	c (t)
<i>Sicalis citrina</i>	Canarinho (MT)	Stripe-tailed Yellow-Finch	i, p	c
<i>Sicalis columbiana</i>	Canário-do-amazonas	Orange-fronted Yellow-Finch	p	r
<i>Coryphospingus cuculatus</i>	Tico-tico-rei	Red-crested Finch	mc,ms,e,p	c (s-Mar-Out)
<i>Arremon flavirostris</i>	Tico-tico-da-mata	Saffron-billed Sparrow	mc	r (t)
<i>Myospiza humeralis</i>	T.-tico-de-bico-amarelo	Grassland Sparrow	e, p	c (t)
<i>Emberizoides herbicola</i>	Canário-do-campo-rabo-longo	Wedge-tailed Grass-Finch	e, p	c (t)
<i>Zonotrichia capensis</i>	Tico-Tico	Rufous-collared Sparrow	e, p	c (t)

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos dois revisores anônimos pelas revisões e correções no texto. Ao IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) pelo apoio logístico na base de pesquisas da fauna de Poconé. E. O. Willis, A. Negrett e J. Vielliard contribuíram com algumas de suas observações para esta lista. Os Srs. Zelito Dorileo (Fazenda Santa Izabel), Sílvio Falcão (Fazenda Rio Alegre) e Aluizio Gouveia (Fazenda Jofre), permitiram-nos estudar dentro de suas fazendas. Estelito Carvalho, Oelio Falcão, Leire Falcão, Tito Correia de Arruda (em memória), Tutu, Ditinho e Joaquim Proença foram excelentes informantes e auxiliares de campo no Pantanal. Valdecira Azevedo datilografou, Tania Pimentel e Bruce Forsberg (INPA), digitaram a versão final do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Allen, J. A., 1891. On a collection of birds from Chapada, Mato Grosso, Brasil, made by Mr. Herbert H. Smith. Part. I. Oscines. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 3:337-380.
- Antas, P. T. Z., 1983. Migration of nearctic shorebird (Charadriidae and Scolopacidae) in Brazil - Flyways and their different seasonal use. Wader study Group Bull. 39 (83): 53-56.
- Antas, P. T. Z., D.C.Oren & P. G. Crawshaw Jr. Lista das aves de Miranda estancia, Miranda, (em elaboração).
- Brown, K. S., 1984. Zoogeografia da região do pantanal matogrossense. Simpósio sobre conservação e manejo dos recursos naturais do pantanal. EMBRAPA - Corumbá, MS.
- Cintra, R., 1988. O Uso de Habitats pelas Aves no Pantanal de Nhecolândia, Mato Grosso do Sul. (Em elaboração).
- Dubs, B., 1983. Die Vogel des Sudlichen Mato Grosso. Verlag verbandsdruckerei. Beta-druck, Bern, 144 pp.
- Frisch, J. D., 1981. Aves brasileiras. Vol. 1. 353 pp. Editora Dalgas-ecoltec Ecologia Tecnica e Comerciais Ltda. São Paulo - S.P.
- Meyer de Schauensee, R., 1970. A Guide to the Birds of South America. Livingston Publ. Co., Wynnewood, Pennsylvania.
- Negrett, A. & R. Negrett, 1981. As aves migratórias do Distrito Federal Bol. Téc. Nº 6 IBDF.
- Negrett, A., J., Taylor, R. Cintra, R. Cavalcanti & C. Johnson, 1984. Aves da região geopolítica do Distrito Federal-Lista (Check list) 429 espécies. SEMA, MINTER, 21 pp.
- Novais, F. C., 1976. As aves do Rio Aripuanã, Estado de Mato Grosso e Amazonas. Acta Amazonica 6 (4) Suplemento: 61-85.
- Naumburg, E. M. B., 1930. The birds of Mato Grosso, Brasil. A Report on the birds secured by the Roosevelt. Rondon Expedition. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 60:VII + 432 pp.
- Pinto, O. M. O., 1938. Catálogo das aves do Brasil. Rev. Mus. Paulista, 22:1-566.
- Pinto, O. M. O., 1944. Catálogo das aves do Brasil, 2ª Parte Secr. Agr., Ind. e Com., São Paulo, XIII + 700 pp.
- Pinto, O. M. O., 1932. Resultados ornithologicos de uma excursão pelo Oeste de São Paulo e Sul de Mato Grosso. Rev. Mus. Paul. Tomo XVII. 2ª parte: 689-826.
- Pinto, O. M. O., & E. A. de Camargo, 1952. Nova contribuição à ornitologia do Rio das Mortes. Pap. Avul. Zoologia. Vol. X, Nº 11 pp. 213-234.
- Short, L. L., 1975. A zoogeographical analysis of the South American Chaco-Avifauna. Bull. An. Mus. Nat. Hist. Vol. 154 (3):165-352.
- Sick, H., 1984. Ornitologia Brasileira, uma introdução. Vol. I e II Editora Universidade de Brasília, Brasília, DF.
- Willis, E. O., 1977. Lista preliminar das aves da parte Noroeste e áreas vizinhas da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil. Rev. brasil. Biol., 37 (3):585-601.
- Weimberg, L. F., 1984. Aves do pantanal do Mato Grosso do Sul. Boletim FBCN, 19:81-88.

